









F. X. f


17


28,679 / A

63.13.47

29548

page 147/14







HIGHMORI EXERCIT. DUSA.

EXERCITATIONES DUÆ.

Quarum prior

De Passione Hysterica:

Altera

De Affectiono Hypochondriaca.

Authore

NATHANAELE HIGHMORO,
Artium & Medicina Doctore.



OXON.

Excudebat A. Lichfield, Acad. Typog.
Impensis R. Davis, Anno Dom,
clō. lōc. lx.

29548



OXONI
OR
TH
REGI
RAD
MED
ET
IND
SIB
EXE
PA
AFF

ALMÆ MATRIS
OXONIÆ CELEBERRIMÆ ACADEMIÆ
ORNATISSIMISQUE VIRIS,
THOMÆ BARLOW
REGINENSIS COLLEGII PRÆ
POSITO DIGNISSIMO,
ET,
RADULPHO BATHURST
MEDICINÆ DOCTORI
ET COLLEGII Stz. ET
INDIVIDUÆ TRINITATIS
SOCIO ORNATISSIMO;
SIBI MULTUM COLENDIS:
EXERCITATIONES
HASCE MEDICAS
DE
PASSIONE HYSTERICA;
ET,
AFFECTIONE HYPOCHONDRIACA:

Amoris ergo officiose & ex

Animo D. D. D.

Nathanael Highmorus;

✠

LE

A

difficu

fron

duc de

incassat

ag om

quapue

lupm

gins de

rum san

atav

tinacien

rit cum

diatari

Lien in

quam in

primam

occafanti

fur obno

quie ge

rum pmo

immedid

Neque m

erum ac

genia

perpelle

illius niti

lone erron

poliatiores



LECTORI CANDIDO.

Affectiones istæ (Lector Amice) non minus doctorem ingenia, quam laborantium corpora diutissime cruciavere. Neque adhuc difficultates hæc solertiſſimorum extricavit industria, quin animus veſtitus avidus in obſtruſo adhuc & tenebris verſatus, quaſi in luto hæreat; nec incaſum minus ſatisfactionem, quam remedium agorus in diſcordantibus multorum opinionibus quaſiverit: uti cuius morborum phenomena perluſtranti, eaſque ſerio cum cauſis inſcriptorum paginis deſignatis conferenti, erit manifeſtum. Mirum ſane non eſt tot miſeros miſellasque cujuſvis ætatis, ſexus ac conditionis, morbos hoſce tam pertinaciter, ad Medicorum uſque opprobrium, afflicti: cum neque pars affecta, nec cauſa morbi immediata rite cognita, remedium direxerit. Uterus ac Lien in affectibus his male ſemper audiverunt, quam injuſte autem facile erit offendere. Quod ad primum ſpectat, non alia induſti ratione uterum accuſant, quam quod femina ſolum affectui hæc ſint obnoxia, aut quod motum perobſcurum in paroxyſmis ſentiant in abdomine; cum interea cæterorum ſymptomatum & cauſa, & partes, à quibus immediate effluxerunt, negligantur aut ignorantur. Neque minus erronea eſt iſta Lienis Hypochondriacorum accuſatio. Multum ſane illorum miror ingenia, qui partis alicujus delicta & erreres tam perſpecte deſignare poterint, cum de officiis & uſu illius nihil certi conſtat. Cum itaque prioris evicta erronea de uſu ac vitiis partium, morbos hoſce voluciores potius ac rebelles magis reddiderunt,

9 2

curamque

euraque difficile in annos sepe, quandoque ad
 vita usque terminum protraxere: quod in scriptis
 reperire non potuerim, diligentiori scrutinio in vivis
 spirantibusque exemplis perquirere statui. Diu ita-
 quo morborum symptomata, eorumque varia perpen-
 dens phaenomena: cum motum illum in hysteriarum
 abdomine, non ab ascendente utero, sed à descen-
 dente diaphragmate profluxisse; lasamque respiratio-
 nem pulmonum infarctum, non utrum effecisse
 animadverti: Lienisque structuram cum officio non
 convenire, nec locum pro hypochondriacorum fluctua-
 tionibus ac murmurationibus in illius angustiis re-
 periri, & ventriculum semper fuisse inflatum, cum
 pertumidum medici damnaarent lienem, ab alio fonte
 emanasse symptomata intellexi. Quod itaque cre-
 brius observationibus sedulo sum exploratus, hic in
 medium proferens doctiorum examini submitto; &
 quod nostra assequi non poterit imperfecta observatio,
 a felicioribus sequentis aevi ingentis in apicem
 proferri exoptamus. Quos si ad penitiorum veritatis
 indaginem hoc nostro labore incitaverim, & agrotis
 rei publicae medicae pergratum opus me exegisse
 rego.

N. H.



INDEX CAPITUM.

Exercitatio Prima.

CAP. I.

PArticularis morbi Historia, pag. 1

CAP. II.

De causis affectus hujus uterini, secundum authores tam veteres, quam neotericos, 2

CAP. III.

De parte affecta, & morbi definitione, 22

CAP. IV.

De morbi causa continente & antecedente, 36

CAP. V.

De iuvantibus quomodo mali causam illustrent, 41

43

CAP.

Index Capitulū.

CAP. VI.

Quae in affectu hoc nocent morbi causam denuntiant, 47

CAP. VII.

Quomodo passiones affectum hunc incitaverunt, 53

CAP. VIII.

Cur femina solum hoc cruciantur malo. 61

CAP. IX.

Quare in omni sanguinis fusione & febris non invadit hystericus paroxysmus. 67

CAP. X.

3^o. *Quomodo spiritus animales in cerebro & nervis repositi in sanguinem ceterosque humores & in copulentiora muscularum corpora agere poterint.* 69

CAP. XI.

4^o. *Quomodo spiritus hi de signatas partes petunt.* 72

Exerci

Index Capitem.

Exercitatio Secunda.

CAP. I.

Particularis morbi Historia. 81

CAP. II.

De parte affecta, 91

CAP. III.

De Affectionis Hypochondriacæ Causis. 99

CAP. IV.

De Lienis usu & officio. III

CAP. V.

De succo Acido seu Melancholico. 134

CAP. VI.

Historiæ cum causis examinatio. 149

CAP. VII.

De invariantibus in hypochondriacis affectibus. 166

CAP. VIII.

De nocentibus in hypochondriacis. 175

CAP. IX.

An chalybs in Affectione Hypochondriacæ
Utilis sit? 178

Pris



Suff
str

EX



aus farn



Πήξ ὑστερή.

*Suffocatio uterina, sive
strangulatio ex utero.*

EXERCITATIO PRIMA.

CAP.L.

PASSIO Hyperica, si-
ve ex utero suffocatio
est affectus fæminis
familiaris, quo suf-
focari & quasi stran-
gulari videntur. Qua-
si ab utero seu parti-
bus fæmineis causam suppeditantibus,
B. dira

2 *De Hysterica passione.*

dira hæc mirandaque symptomatum
cohors ortum peteret.

De nominis Etymo parum solliciti,
hic non multum litigabimus uti nec
morbus, an symptoma fuerit hæc pas-
sic. Sed ut clarius atrocissimi hujus
affectus innotescat natura; cum non
minus sit in accidentibus mirabilis,
quam in symptomatibus varius; ut in-
expertis sæpe suspicionem numinis
præbuerit, historiam ejus brevi sic de-
pingendam curavimus.

Affectus hic siue symptoma plures a-
ctiones lædens in Temperamentis præne
singulis, præcipue autem choleris, ad
iram pronis & orio educatis, in quibus-
vis ætatibus virginibus præcipue calidi-
oribus, veneri pronis, viduis vetulis,
etiam pregnantibus cacochymicis, &
puerperis cernitur. In juvenibus ple-
rumque desinit cum parere incipiant. In
senioribus si diutius duraverit propter
cacochymiam vix curatur, in preg-
nantibus & puerperis periculosum val-
de habetur malum.

Statis nonnunquam affligit periodis.
certosque circuitus nunc annuos, nunc
quovis mense, septimana qualibet, a-
liquando

De Hysterica passione 3

Aliquando singulis redit diebus. Nunc vagus, prout externis accidentibus, infueto aere, vel passionibus commoveantur humores, nunc crebrius, nunc rarius, paroxysmo nunc brevior nunc longior in misellas furit.

Insultus paroxysmi frequenter subitaneus est, nonnunquam verò prænuntios habet magnos, capitis, frontis maxime, temporumque dolores, aurium tinnitus & pulsationes, tristitias, cordis tremores, aliquando durabiles satis, nunc citò rursus evanescentes, cibi fastidium, aspectum tristem, ac faciei pallorem, spontaneas lassitudines, vagosque in artubus dolores.

Paroxysmo invasuro graviora ingruunt symptomata, excruciantque cordis gravitas insignior, animalium actionum omnium torpor. In ventre infimo, præcipue sub Hypochondriis, globi ascendentis motus Diaphragma impetuosè comprimit. Ructus, oscitatio, pandiculatio, respiratio brevis ac crebra & tandem nulla, morbi adventum monstrant: Cordis inde palpitatio fit

B 2

vehementius

De Hysterica passione.

vehementior, pulsus imminutus aut nullus. Per gulam quiddam respirationem intercipiens ascendere sentiunt. Mox brachiorum crurumque varii motus convulsivi, distortionisque capitis ac manuum stupendæ, gestulationes miræ, desipientia, fletus, risusque alternatim insequuntur, frontis temporumque venæ turgescunt, totaque facies aut summè rubet, aut tandem livescit. Oculi inversi sunt, palpebræ frequenter dehiscences totum oculi album ostendunt, dentes arctissimè cohærent, ac inter se colliduntur, cervicis vasa, venæ scilicet & arteriæ distenduntur; vox ut in strangulatis aufertur, nihilque nisi gemitus & suspirium est; etiamsi vehementer inclames, non sentiunt. Sensus interiores omnes abolentur, simul et exteriores, finito paroxysmo, aliquando ipsis nihil ignotum erit, nonnunquam omnia circa ipsas acta ignorant: deliria & convulsiones cum syncope, spumâ nonnunquam per os profluente, tragædiæ huic complementum addunt. Oculi clausi manent vel fixi. Totumque corpus refrigeratur adeo, ut per dies

De Hysterica passione.

3

dies aliquot non raro inter mortuas enumerentur. Tandem suspiriis altis emissis, fletu sæpe largiore accedente ad sese redeunt.

Paræus
lib. de ho-
minis gen.

c. 46.

Schenk'us

obs. c. 288.

Sternutatio si superveniat citò paroxysmum claudir.

Placato paroxysmo de angore cordis capitisque gravedine conqueruntur. languidæ corpore, viribusque destitutæ per dies aliquot insequentes jacent.

Quæ juvant, aut levamen saltem aliquo modo inferre videantur, sequuntur sic à medicis enumerata.

Abdominis utrinque compressio, vel à fasciis valida constrictio, usque ad paroxysmi finem plurimum juvat; sicuti & graveolentia naribus, pudendis autem suaveolentia admota. Aquæ frigidæ haustu largiori sæpe à Paroxysmi vehementia liberantur. Frictiones extremarum partium, ligaturæ dolorificæ, clysteresque revellentes multum prodesse videntur. Aquæ spirituosæ, theriacalis scilicet, Epileptica Langii, & hujusmodi simplicibus calidioribus,

B 3

vapores

6 De Hysterica passione.

vapores ac flatus discutientibus medicata, maximè accessionem minuunt; atque ideo Bezoartica omnia maximo cum emolumento exhibentur.

Quæcunque sanguinis orgasmum concitatiores restringunt tenuioresque ejus partes incrassant, & ad debitum temperamenti statum reducunt, contra illius impetum maximè valent.

In ipso paroxysmo, sanguinis ab extremis artubus detractio manifestè levat, eaque reiteratâ solâ, sapissimè insultus vehementiam fuisse fractam, motusque convulsivos profligatos vidimus, cum cætera omnia remedia nihil profecere.

Sunt & quæ extrinsecus adhibita paroxysmi furorem irritant, vel insultus adventum accelerant, & durationem augent: Ita suaveolentia vel in accessione, vel extra ferre nequeunt, imo sæpe horum solummodo odore recrudescebat malum. Quavis vehementi passione commotæ, vel ad iram, timorem, amorem, aut si nimium calore æstatis, hypocausti violentiore subito infervescent, aut frigore intensiori diu pori constringantur corporis, passio hæc incitatur.

Extra

De Hystercai passione. 7

Extra paroxysmum, dorsi doloribus, capitis gravedine ac distentione, partium extremarum cruciatibus fumisque calidioribus faciem ac caput petentibus vexantur. Aliquando laxatis articulorum ligamentis, motus vel impeditur, aut cum fragore quodam efficitur; palpitaciones cordis sæpissime molestant, murmura ac rugitus frequentissimè sub Hypochondrijs exaudiuntur: nunc frigida, nunc calidissima auræ ascensus per dorsi longitudinem nonnunquam rapidissimus percipitur. Et si diutius duraverit intemperies, & accessionum frequentia supervenerit; etiam extra paroxysmum actiones læduntur animales, & vel memoriâ abolitâ, aut diminutis cæteris animalibus actionibus insipientes exinde redduntur.

Sunt & alia symptomata huic cognata, maribus æque ac fæminis communia; quæ ut historiam hanc perficiant, sic ad causarum detectionem inservire poterint. Suntque Epilepsia, Convulsio, Incubus & affectio Hypochondriaca. In quibus præter motus convulsivos, in paroxysmo adsunt sus-

locationis metus, faciei livor, venarumque ejus summa dilensio, respirationis interceptio, thoracis laterisque maxima compressio, quibus manum ut dolentibus semper admovent. In singulis vero hisce symptomatibus non omnia enumerata reperiuntur signa, sed in omnibus quædam inveniuntur, à quibus atroci huic affectui cognationem vendicent.

Absolutâ sic morbi historiâ, quæ & futuri & præsentis paroxysmi signa illustravit pathognomica, quibusque remediis contemperatur symptomatum furor, quibusque incitatur, designatis, facile erit hinc & partem affectam & mali authorem seu causam investigare.

CAP. II.

De causis affectus huius uterini, secundum auctores tamen veteres, quam neotericos.

Quia affectus hic muliebris est, utrum mali authorem esse penè unanimo consensu contendunt Medici, quem seminis corrupti, aut sanguinis menstrui vapores sursum ferentes, motus in ventre ascendentis globi æmulantur: Diaphragma, respirationis organa, ipsæque cor inde violentâ compressione oppugnantur, & suffocatio serio metuenda est: tandem succedunt Syncope, cordis motus, ac pulsus abolitio.

Alii hanc uteri in Diaphragma violentiam suspectam habentes, ad vapores, à semine aut menstrui sanguinis in utero corruptelâ, malignos recurrunt;

To De Hysterica passione.

qui prout in diversas elevati distribuuntur partes earum actiones lædunt. Ubi ad cor ferantur, ejus actiones prosternunt, ac spirituum influxu ad extrema inhibito, totum extra frigidit corpus, facies pallescit, pulsus immittitur, imo Lypothymia & Syncope, sequuntur.

Neque cerebrum diu à vaporum furore ascendentium est immune, sed venenata illorum qualitate consternatum, spirituum fluxus animalium prohibetur, sensus & motus omnis læditur, thoracis actio & Diaphragmatis impeditur, & respiratio redditur difficilis: Eodem modo quo dormientibus Incubo vox intercipitur; sensus tam interni quàm externi depravantur, motusque incitantur convulsivi.

Carolus Piso motus convulsivos in hoc affectu non à vaporibus, sed à repletionem cerebri ex proluvie serosa enasci putat, cum scilicet à repletionem serosa in latus distendatur cerebrum ac sese brevius efficiat, totum genus nervosum ad se trahere, atque sic motus illos inordinatos edere constantesque inde rigores in Hystericiis inveniri.

niri autumat. Recentiores verò cum ad membrorum motum, nervos solum pro spiritibus vicem supplere canaliculum, quibus aliis partibus transferantur & musculos immediate partes movere singulas intellexere; huiusmodi nervorum à repletione contractionem, non minus quam Hypocritis inanitionem à causarum excluderunt classe.

Hecsterus affectus huius causam, nec à viri contubernio consuetudo omisso, ut in viduis, nec a feminis corruptione in vetulis, quæ virorum concubitu nunquam gavisæ sunt, admittit, neque minus cordis refrigerationem, vel alterationem, vel fugam ad extra, vel revocationem ad intra caloris, factam damnat. Quin nec dissipationem spirituum, aut vitalis humiditatis (cum citò excitentur) fieri contendit. Cb cerebri verò & cordis quietem effici concludit. Cor autem ventriculos; ne virus Hystericum ingrediatur, contrahit, à pulmonibus aerem non repetit, sed humor vitalis quasi coagulatus immobilis in ventriculis latitat, pulmones & thorax ad motum non sollicitantur, à cerebro

cerebro vim moventem non flagitant ; Cerebrum à veneno consternatum cessat a motu: prout membrorum horum arces dispositas reperit, ita suas actiones dirigit venenum. Non autem a reatu omnino uterum excusat, sed ad spasmodicam affectionem ejus errorem accedere opinatur, quæ si reliquis conaris partibus nervosis communicetur, assurgunt & illæ in hostem. Primò abdominis, mox thoracis partes musculosæ tenduntur, respiratio hinc difficilis, mox impedita fit, medicamentis verò dissipantibus absumuntur vapores, ac uterus ad locum redit proprium.

Quod ad matricis spectat motum sive proprium (quasi animal foret, uti narrant cogitasse Platonem) sive a vaporum inanitione (unde appetitu humiei sursum ferri uterum vult Hippocrates) sive à plenitudine (ut mavult Galenus) sive à vaporibus ac flatibus incitatum, cum ascensus cujusdam quasi globi in ventre inferiore Diaphragma prementis, paroxysmi hujus semper sit comes crudelis, nefas erit jam Mulierculis non consentire, motumque hunc ac mali totius causam non ascribere

bere utero, præsertim dum tota penè medicorum cohors illarum insomniis adstipulatur.

Uterum verò hujus erroris fuisse conscium admittere nequeam. 1. Quia affectus hujus symptomata ab aliis dependere causis videntur, ut fusiùs infra demonstrabitur. 2. Quia talis motus quo Diaphragmati vim inferre videtur, utero non competit. 3. Si motus iste ascendens cujusdam in ventre infimo non sit matricis, nulla cogit necessitas, ut cor aut cerebrum aliasve partes a vaporibus uteri malignis periclitari, mirandorumque omnium symptomatum autorem fuisse concedamus.

Motus vero iste utero non competit.

1. Quia omnis motus locomotivus (qualis iste uteri, secundum Hippocratis, Platonis, Galeni & aliorum placita, si quis sit, foret) per fibras nervosas parti movendæ, alterique mobili affixas efficitur; quibus contractis mobile ad immotum trahatur. Neque ullo modo ultra fibrarum principium, seu immobile illud quod movetur, progredi poterit. Uterus autè cū sit pars corporis membranosa inferioribus duobus vinculis

14 De Hysterica passione.

culis, totidemque superioribus, regi-
oni propriæ affixa; nec se movere, nec
à ligamenti ultra spæhrâ attrahi pote-
rit. Accidit vero nonnunquam ut
laxatis malèque dispositis superioribus
vinculis, propria uteri gravitas deor-
sum tendat; laxatis etiam inferiori-
bus, arrodente vapore incitata superi-
ora sursum trahere uterum certum est.
Ultra vero partem, cui & ipsa affigun-
tur ligamenta, matricem attollere ne-
queant. Vincula Superiora, cum ossi
Ilei lateribus annectantur nequa-
quam ad septum usque auxiliariis
hiscæ uterum adigere poterint: quia ul-
tra fibrarum originem nulla datur
trahendi potentia. Os verò Ilei infra
septi stationem multo deprimitur.

Neque magis a flatibus inclusis eleva-
tus uterus quàm à motu proprio aut gra-
vidatione in puerperis aut ventriculi &
coli inflatione offendit. Ad ventriculum
usque extensa matrix in gravidis, nec
talem edit motum, nec tam atroces
generat affectus. Inflatus ventriculus
Diaphragma forsitan premit, motum e-
jus liberum aliquantisper restringit;
non respirationem tollit, aut convul-
sas

fas relinquit. Medicorum observatio-
nes de uteri inflatione & hydrope, se-
veriori scrutinio examinentur, & stu-
pendas ejus extensiones ulnas nonnun-
quam binas vel tres excedentes, cum
variis humoribus inclusis, iisque pu-
trescentibus, non tamen symptoma-
tum horum suffocationis aut ascenden-
tis globi, conscias inveniemus.

Senertus hujusmodi pressus angusti-
is, uterum suis vinculis restrictum,
regioni propriæ affixum reliquit, &
Testiculos fæmineos (qui laxius pen-
dent, nec alicui arctè alligati, ut ute-
rus) hujus mali motusque reos arguit.
Qui a feminis corrupti vaporibus in-
clusis elewantur, & ascendentes sep-
tum violarunt, ac respirationem læ-
dunt. Opinione & observatione Rio-
lani suffultus, qui *Anthropograph. Lib.*
2. Cap. 34. Scribit se in Hystericis
virginibus deprehendisse testes pugno
grandiores, seroso semine turgentes,
quinetiam Tubam uteri amplificatam
& valde dilatatam.

Qui vero in dissectionibus versatus a-
natomicis testiculorum structuram & fi-
tum accuratius perpenderit, & illos
etiam

etiam regionibus propriis affixas et immobiles inveniet. Neque major in illis reperitur levitas, quam in utero, ut inflati septum violare poterint. Vapores inclusi partes illorum distendere ac intumescere, non locomovere possunt: ut ascendant globi instar. Neque semper in hoc affectu semen invenitur corruptum. Juvenulæ nuptæ quæ plures ex viri contubernio proles susceperunt, vel in mediis virorum amplexibus hujusmodi sæpe cruciantur symptomatibus.

Nec minus injustè sanguis accusatur menstruus, licet retineatur. Non enim in gravidis per novem menses detentus, nec in quibus ad annum vicissimum & ultra fluxus hic expectatur, symptomata hæc concitat. Alios vero, rectè accedentibus menstruis, Hæmorrhoidibus identidem ubertim fluentibus, quibusque singulis quatuordecim diebus fluxus iste irritatur, ab atroci hoc affectu etiam vexari, medicorum observationes & frequentior experientia abundè testantur. Non itaque a reventis menstruis generatur.

Prædictis non acquiescentes ulterius obijciunt;

ciunt; licet semen in utero aut vicinis
vulvibus non corrumpatur, neq; sanguis
menstruus retentus sit, ut eo nomine
putredinem acquirat, unde vapores ve-
nenati vitalia ac cerebrum oppugnent;
humores tamen illic congesti peculiari
modo corruptionis à peculiari uteri
substantia nato, malignitatem induente,
putrescere & ad partes nobiliores vapo-
res malignos transmittere poterint.
Quasi conata & naturalis in utero foret
malignitas, quæ humoribus putrescenti-
bus hoc contribueret venenū. Humores
in aliis corporis partibus corrupti, vel
sanguis seu bilis, aut pituita, talia non
generant symptomata, sed peculiaris u-
teri substantia illud quod Phlegmonem
duntaxat in aliis partibus efficeret, hic
in venenū cōmutat. Sed hic rationē af-
ferre debeant quare malignitas illa na-
turalis sine humorū accessione perpetuos
non evomat vapores: aut quomodo pa-
roxysmi fit intermissio, aut quare sexus
muliebris totus crudeli huic non sit ob-
noxius affectui? in singulis enim uteri
peculiaris ista reperitur substantia, nec
desint humores qui malignitatē istā in-
duant; a singulis lunare non solvitur tri-
butura

nec causa nec materia desunt, solum effectus desideratur, omnes crudeli hoc carnifice non cruciantur. Pereant itaque & hæ claudicantes Hystericorum symptomatum hypotheses, nec maiorem antiquorum infornis invenient gratiam.

In Hepatis Anatomia a Dre. Glissonio nuper edita aliam huius affectus rationem invenio. Ubi uterum partem principaliter esse affectam statuit; motum verò illius ascendentis quasi globi in ventre, & suffocationem ab illo proficisci non posse indicat. Sed vel per sympathiam, vel a vaporibus ab utero elatis Musculi abdominis affecti, ut malum excutiant vehementi nisu contrahuntur, intestina fortiter comprimunt, tantaque violentia sursum adigunt, ut Diaphragma inde motum suum deorsum versus expedire nequeat, unde suffocatio advenit: motum verò illum seu tumorem ascendentem in ventre, esse duntaxat partium quarundam musculorum abdominis peculiarè mobilemque convulsionem, nempe in uno aliquo musculo, aut nonnullis illius fibris arbitratur; adeo ut convulsio ejusmodi

De Hysterica passione.

19

ejusmodi ab his in illas ejusdem musculi aut alterius fibras repret, & quoniam fibras quas oblidet instar nodi aut tumoris attollit, locumque variè mutat, inde factum ut tum agræ tum alii tumorem hunc mobilem sentientes matrici hanc loci commutationem adscribant.

Motum vero illum in ventre Hystericarum, atque inde suffocationem, à particulari musculorum abdominis convulsione provenire non posse arbitramur.

1. Quia Musculorum fibræ in abdomine dum contrahantur, in tumorem se attollere nequeant, contractæ enim distenduntur in latus, breviores & rigidæ fiunt, suisque affixæ terminis, extrorsum non impelluntur, sed omnia introrsum adigunt, simulque & ipsæ deprimuntur, atque ideo ut in tumorem seu nodum talem convellantur, illarum potius relaxatio quam constrictio requirit.

2. Convulsio fibrarum atque inde motus ille & perreptatio secundum fibrarum rectitudinem fieri debet à capite versus caudam ejusdem musculi.

Atque

Atque sic tumor ille nobilis vel oblique descenderet, si in musculo oblique descendente; vel oblique ascenderet, in oblique ascendente; vel transversim in musculo transverso perreptaret. In rectis solum versus Diaphragma ascenderet, qui cum medium abdominis ad latera umbilici utrinque occupent, mobilis illa fibrarum convulsio & tumor solum in medio ventris inveniretur. Admota vero manus etiam in Hypochondriis utrisque inveniri docebit.

3. Motum illum ascendentis globi & suffocationem in expiratione solum sentirent, si à contractione & convulsione musculorum abdominis fieret. Musculi enim abdominis expirationi ancillantur, quorum nisu & contractione inspiratio omnis intercipitur, viscera inferioris ventris comprimuntur: & abdomen decidit ac detumescit, sed tumorem illum, dum inspirat ægra, alius ascendere admota manus docebit; dum scilicet septum continuatâ suipsius contractione viscera inferiora, ventriculus scilicet inflatus deprimat, & intestini, tunc abdomen attollitur & ventriculus inflatus cum intestinis tumorem

morem
quilibet
ascendat
cernitur
Musculor
Motus
diximus
phragm
tinuo de
licet insp
omnem
videretur
quia cont
prum cor
nis non
nun exp
guinis sp
la contem
unde nece
Causar
periculis
oibus pr
militura
hutoriz q
ma soluti
damner
quens der

morem efficit in hypochondriis ; ut a
qualibet septi contractione novâ, ultra
ascendat, & quasi movere quidcum
cernitur. Ergo non a contractionē
Musculorum abdominis producit.

Motum hunc, inspirante ægrâ, fieri
diximus à contractione & descensu dia-
phragmatis, cujus motus obscurus con-
tinuò deprimit intestina & ventriculū,
licet inspirare non cernatur ægra ; imo
omnem respirationem planè intercipi
viderur, & inde suffocatio insequitur :
quia contractum & quasi convulsam se-
ptum contractioni musculorū abdomi-
nis non cedit, adeo ut nullâ fiat fuligi-
nis exspiratio, aut pulmonum a san-
guinis spirituosâ infarctu lacunatio, nul-
la contemperantis aeris novi admissio,
unde necessario sequitur suffocatio.

Causarum hujus mali catalogum, à
peritissimis tam antiquis quàm recenti-
oribus prolatum medicis, habetis ven-
dillum. Neque tamen quamvis morbi
historiæ quadrantē, aut ejus phænome-
na soluturam invenio : quis itaque in
laminarum locis substituiamus subse-
quens demonstrabit enarratio.

CAP. III.

*De parte affecta, & morbi
definitione.*

MAli causam descripturus, definitionem primo expediam, partemque affectam designandam esse necesse est.

Passio hæc (Hysterica dicta) est strangulatio à nimio sanguinis subtilis ac flatulenti in pulmonum vasibus cordisque thalamis, infarctu orta: Quo pulmones motum sequi thoracis & Diaphragmatis inhabiles, ac cor suos sinus ab infarctu isto pleniori, per pulsus, licet frequentiores, liberare ineptum redduntur. Atque hinc necessario insequitur primo dyspnoea, & inde suffocatio, quam ut effugiat natura, facultatem invitat animalem, quæ nè simul cum vitali pereat, spiritus suos copiose, licet inordinate & irregulariter emit, qui sic profusi, motus tales irregulares, quos convulsivos vocant, exci-
tant.

Definitio

De Hysterica passione. 23

Definitio hæc descriptiva ex morbi historia examinata, & affectam partem, & morbi symptomatumque causam facile monstrabit. Quæcunque enim causa huic assignabitur, & omnibus vel plerisque historiae observationibus non respondet, eam ex sufficientium causarum catalogo delendam esse judicamus.

De parte affectâ garrulam satis inter Authores foveri controversiam superiores paginae retulerunt, quorum opiniones ut claudicantes & historiae morbi non respondentes repudiavimus. In definitione verò statuimus partem in atrocissimo hoc affectu, & in paroxysmi furore præcipue laborantem esse pulmones, & cordique contermina vasa.

Pulmones sanguinis flatulenti, tenuioris subitoque rarefacti infarctu gravati, à septo aggre sollicitante, moveri non poterint. Cordis thalami & auriculæ, copiâ irruentis sanguinis inflati, per pulsus laboriosè icet repetitos lacunari nequeant. Hoc ipsum prænuntiæ indicant tristitia, cordis anxietas, tremor, palpitatio, pulsus

Pars affecta in Hysteriis.

24 De Hysterica passione:

pulsus frequentia, debilitas, intermissio, & tandem quies, cum motus cordis planè defecerit, Lipothymia & Syncope. Pulmonum gravitas & ad motum ineptitudo, anhelitus graves, suspiria alta & frequentiora, thoracis quasi compressio, & in gulam ascendentis cujusdam respirationem planè interceptantis sensus; ac labor diaphragmatis sollicitus, quo onere isto gravatos pulmones liberet, partes hascè laborare demonstrant: cum enim pulmones adèò infarcto sanguine graventur, ut à motu thoracis & diaphragmatis agrè attollantur, quasi quidquam in gula ascenderet, queruntur misellæ: cum revera ipsi pulmones ob pondus insuetum movere, & ob quietem aerem admittere nequeant. Actiones hæc læsæ, propria & pathognomica Hysterica affectionis signa, locum affectum seu proprium morbi subiectum enodant; utrumque à reatu prorsus excusant. Præcipuè pulmones affectos esse diximus, cum verò incensus suam sanguis extendit tyrannidem, in singulas penè corporis regiones diffusus dominium exercet; dum in pulmonibus sistatur motus

ejus

ejus circularis, vasibus illorum sanguine jam copiosè infarctis, cordis dexter ventriculus lacunari nequit. Sed obice hìc sanguini objecto, jam ebullienti, in vasa refluit majora, truncum Cavæ descendentem, & jugulares, quæ ab arteriis continuatis istibus successivè adimplentur, capitisque vasa distendit multum, ac inde primo gravelines, dolores insignes, ac pulsationes efficit, deinde faciei, frontes, ac collum tument venæ, totaque facies ex abundantia sanguinis æstuantis profluvio ruget maximè, ac tandem livet. Neque aliter sese habent malo hoc laborantes, quàm si funibus strangulatæ forent, eorundemque modo spiritus suffocantur & mors ipsa inducitur. Huic ideò non rò supervenit Apoplexia, cum à distensis vasibus spirituum animalium interdicitur profluvium.

Hinc per dies aliquot paroxysmo pesto, a vaso um summâ distensione, de spiritus gravedine, hebetudine spirituum, angore cordis, & tristitiâ conqueuntur. Oculis etiam caliginem, ventriculo nauseam, & ciborum fastidium, tremis dolores excruciantes, articu-

lis debilitatē affert paroxysmus præteritus. In intestinis viscosos hūores discutit in flatus; atque hinc rugitus & murmura, dolores in hypochondriis luxuriant acuti. Unde lien semper malè audit, ventriculus & colon flatibus distenduntur, adeo ut & extra paroxysmi furorem, diaphragmatis illarum inflatione impediatur motus, & anhelitus gravis & difficilis reddatur, ut ægre sua munia obeant consueta.

In abdomine quiddam ascendere, & laborantes hystericæ, simul & adstantes opem ferentes affirmant, manus enim admotas strenuè attollit & diaphragma comprimit.

Uterum a motu hoc erratico supra vindicavimus; hinc ejus loco intestina, visceraque abdominis à diaphragmate violenter depressa substituimus, quæ

motum quandam assiduum, quasi cuiusdam ascendentis simulant; Qui motus quoniam à diaphragmatis motu dependeat, illius actionem & motum consideremus.

Motus hic diaphragmatis licèt modo naturali

naturali & ob finem consuetum (respirationem scilicet) fiat, tamen convulsivus quodammodo est & irregularis, ut infra illustrabitur.

Actio diaphragmatis in respiratione, est partium fibrosarum contractio, quæ extrema ad centrum, & totum summè tensum deorsum feruntur, & substrata inde deprimuntur viscera. Quæ ut spaciū sibi congruum obtineant, hypochondria utrinque & abdomen attollunt: thoracis indè cavitas amplior redditur, distenduntur pulmones, & fit inspiratio. Laxatis autem fibris, diaphragma, visceribus & intestinis loca propria petentibus, à musculis abdominis compressis cedit: & inde rursus in thoracis cavitatem impellitur sepum, viscera sequuntur, decidunt hypochondria ac pulmones, & fit expiratio.

Ad motum hunc contractionis & relaxationis fibrarum, necessitate cor ac sanguinem refrigerandi incitatur diaphragma, quod ope spirituum animalium perficitur: qui à cerebro in fibrosamque texturam affluentes, & alternatim redeunt, & contractionem, & relaxationem,

laxationem celebrant. Dum affluunt spiritus, infarciuntur fibræ, extenduntur in latus, & fiunt breviores: Unde necessario sequitur contractio. In relaxatione omnia contrario modo accidunt. Motus hujus necessitatem urget sanguis in cordis sinubus summe incallescens, qui in pulmones continua pulsatione ejectus, & inspirato aere refrigeratur, & ampliore conciliatâ cavitate in pulmonibus, jam à septo distentis, uberius è corde exilit. Vasa enim capaciora reddita copiosius sequacem exhauriunt sanguinem, præcipuè si ob calorem tenuior, aut ob passionem aliquam concitator fiat motus. Atque sic quamlibet Diaphragmatis contractionem necessitati huic obedientem, cum in abdominis cavitationem deprimatur, pulmonum distensio, vasorum sanguine & aere repletio, & hypochondriorum elatio sequuntur; depressis enim intestinis attolluntur hypochondria & abdomen. Relaxationis verò comites sunt thoracis & pulmonum compressio, ascendente septo in pectoris cavitationem, & casus hypochondriorum; ita ut Diaphragma sursum ac deor-

deorsum alternatim actum, Motum quendam assiduum ad extra in hypochondriis & abdomine simulare facileprehendamus.

His ita statutis, causam motus illius in abdomine (quem uteri esse fingunt) & doloris spasmodicam Septi contractionem sequentis, facile explorare possumus. Sanguis enim in cor, ac pulmones impetuosius præter solitum irruens, illorum vasa summè distendit; ut ad Septi relaxationem fatiscere ac desidere (uti solent) nequeant. Sed quolibet pulsu plus à cordis æfluantis sinu arripitur, magisque semper distenduntur, & tandem quasi in gulam ascenderent pulmones tumidi suffocationem minuntur. Diaphragma (interim (cujus actio solummodo est fibrarum contractio) calore circa cor ac pulmones (à retentione fuliginum) arcto, irritatum; nè suo deesse officio videatur, fibras suas vehementius ac creberrimè stringit, & se in abdominis cavitatem qualibet contractione altius deprimat; unde pulmonum vasa, amplificatis locis, pleniori infarctu distendit. Intestina depressa abdomen & hypochon-

dria attollunt, motumque sic ascendentis cujusdam illic æmulatur, tantòque vehementior fit ascensus, quantò violentiore contractione intestina cæteraque viscera compresserit Diaphragma, ut cuilibet, ubi libuerit, experiri licet, si in libera inspiratione manum hypochondriis imposuerit. Continuatæ has fibrarum contractiones, perpetuâ necessitate sollicitatas, quàm brevissimæ & quasi tentatæ interpellant relaxationes, quibus pulmo flatulento ac ebullienti sanguine infarctus minime cedit; atque ideò brevissima & quasi incepta solummodo expiratio continuò interrupta, repetitâ contractione simulatur; quæ cum crebra ac parva sit, motus ille in abdomine nunc cessat parùm & quasi descendit, dum brevissima illa instituat pulmonum laxatio; statim verò intenditur, altiùsque ascendit, cum deprimitur septum magis, magisque admotum manum propellit; & hinc quodammodo mobilem tumorem illum sentiunt. Ac tandem cum ultrà adigineque septum, irritæque relaxationes ad sanguinis flatulenti expressionem nihil profuerint strictis fibris summè, distentum

De Hysterica passione. 31

Stentum à motu plane desistit, tota aboletur respiratio, & maximè attolluntur hypochondria, tumorque ille fixus in latere manet. Donec tandem ut à periculo maximè urgente liberetur Hysterica; facultas animalis (ut nullum immotum relinquat lapidem quo malum fuget) spiritus ejus in musculos abdominis expirationem facientes (cùm inspiratione continuatâ nondum levetur) copiosè effundit, qui, contractis fibris, Intestina impetuosè, etiam sursum, contranitente Diaphragmate, ad thoracis cavitatem comprimunt, & pulmones distentos, sanguine aerèque fuliginoso expresso, desiderare cogunt. Inde se contrahit Diaphragma, magnâque fit inspiratio sanguinis conflagrationem & furorem compescens, & sinus cordis rursus lacunant pulmones. Abdominis musculis alternatim constrictis, fit rursus exspiratio, pulmones suum excludunt onus, & in hypochondriis mobile illud descendere sentitur. Hinc alta illa eduntur suspiria, quibus semper terminatur paroxysmus.

Sæpe etiam excitatur sternutatio, quæ si superveniat, bonum esse denuntiat

aphorismus: idq; ut signum & ut causa, fortem enim & excitatam animalem facultatem, & Diaphragma à convulsivâ contractione liberum indicat: ut causa bonum est, quia violenta illa musculorum abdominis contractione, pulmones ab infarctu sanguineo diutius comprimuntur, & felicior magisque ordinatus fit, illorum ac diaphragmatis motus.

Si qui viscosi humores in ore aut glandulis laryngis motus hoc solvantur, à perpusillâ illâ expiratione, quam supra tantum inchoatam non perfectam esse diximus, in spumam efflati per os sæpe profluunt, ut in Epilepticis etiam solent,

Similem huic Diaphragmatis motum, & effectum non dissimilem illi consequentē, in risu profusiore & immoderato videre liceat: qui aliquando tantus est ut Syncopes & vitæ periculum sæpe inde provocentur; suffocationem, vasorum omnium in capite, ac facie, summam à sanguine repletionem, atque inde rubedinem insignem, & tandem livorem (symptomata mali hujus pathognomica) concitat; imò ab hoc solum inordinato,

De Hysterica passione.

33

dinato, affectio hæc Hysterica excitatur. Quomodo autem tam-tristis effectus à risu ortum habeat inquirendum est.

Risus à motu Diaphragmatis inter-
terciso frequenti & quasi tremulo effi-
citur; quo multiplex & interrupta
expiratio in vocalibus instrumentis mo-
dulata sit. Damnum quod
animali ab inordinato hoc
affectu contingit, enascitur
ex motu Septi interciso :
cum nondum peractâ re-
laxatione, sequente alterâ fibrarum
constrictione, interrumpitur motus e-
jus alternus : adeò ut nec expiratio
perfecta, quâ fuligines effundantur, nec
inspiratio proportionata, quâ sanguis é
corde promatur, & ab aere in pulmo-
nes attracto contemperetur, celebra-
tur. Hinc sanguis nimium excande-
scens, frequentibus é corde pulsibus e-
missus in pulmonum vasa copiose ma-
gis effunditur, quàm ut ab interruptâ
Diaphragmatis relaxatione depleri po-
terint. Atque inde restagnans vasibus
pulmonum & cordis sinu dextro infar-
ctis, cervicis capitis & faciei vasa æstu-

*Quomodo
risus hunc
affectum
generat.*

anti sanguine impensè distenta turgent, ruborque perpetuò usque ad livorem auctus diffunditur; in corde suffocantur spiritus & ob quietem incipit grumescere sanguis, atque inde Syncope; In cerebro, à vasorum nimia distensione, spirituum animalium impeditur effluxus; atque sic artuum debilitas, aut motus convulsivus inducitur. In Capite & Cervice autem, quia frequentiores & majores sunt venæ quam in aliis partibus, distensio hæc faciliùs & graviùs discernitur.

Diaphragmatis motu sic perturbato, cerebro etiam cordèque periclitante, ne totum ruat, in consensum vocantur omnes actiones: spiritus animales, ut ab inimico liberentur, impetuosè & inordinatè in omnes partes propelluntur, ac diversos edunt effectus. In corde vehementium contractionum, pulsusque primò inordinati tandem intermittentis, inde tremuli (donec infarctis nimium ventriculis planè cessat motus) sunt authores. In ventriculo inordinatà fibrarum contractione vomitum causant. Oculorum glandulas & musculos stringentes, lachrymas involuntarias co-

piose

De Hysterica passione. 35

piosè exprimunt. In musculos nunc hos, nunc illos profluentes, motus causant convulsivos, gesticulationes miras, variasque partium distorsiones; prout hi vel illi spiritibus distendantur muscoli. Si spiritibus vapores flatulenti etiam adjungentur, pars ita distenta diu rigida & inflexibilis, convulsa manet; donec spiritus illi flatulenti vel externis admotis, aut calore partium naturali discutiantur, aut muscoli aduersi vehementius acti, in contrarium trahunt. In intestinis humores fundunt, & in flatus attenuant, ut præsens inde sæpe augeatur malum. Rugitus hinc, ructus & murmura excitantur, flatusque nunc sub cute repentes, animalis cujusdam gressum fingunt, nunc instar fulminis prouunt, nunc aquæ frigidioris delabentis, jam æstuantis fugam (prout eminùs aut cominùs à rarefaciente calore distant) mentiuntur; atque hoc etiam extra paroxysmum sæpe accidit.

CAP

CAP. IV.

De morbi causa continente & antecedente.

CAusam itaque continentem hujus strangulationis, Infarctionem sanguinis flatulenti & serosi, ebullientis in vasibus pulmonum & cordis, esse statuimus. Atque hoc non solum medicorum testantur observationes, sed mali historiâ examinatâ, nullam aliam admittere causam queat hysterica hæc suffocatio. Inter observatores Medicos, Felix Platerus obser. de respirationis defectu narrat quandam ante mensium eruptionem hystericis accessibus & sanguinis expuitione semper laborare; cui vena quotannis in manu, & sæpe in pedibus, ut copiosè afflueret, aperiebatur, & nisi hoc illi factum fuisset; sanguinem copiosè expueret, & hysterica foret. *D. Hechsteterus* in suis obser. historias affert plures Hystericarum; quarum aliæ remoratis mensibus, aliæ

De Hysterica passione. 37

aliæ fluxibus mensium inordinatis, singulis quatuordecem diebus redeuntibus, symptomata hæc perpeffæ; solâ sanguinis missione decussatim per artus, eaque sæpius repetitâ convulsiva (nihil cæteris proficientibus) terricula-
menta profligata fuerunt. *Areæus* co-
quam noctu sanam lectum ingressam
manè ore à spasmo occluso inventam,
venâ in pede sectâ & anti-hystericis sa-
navit. Ex observatione propria plures
cruentâ hâc vindictâ ab immani ac-
cessionum ferocitate liberatâs; alias ex
paroxyfmi ipsius furore revocatas novi-
mus. Unam atque alteram menâbus
ritè fluentibus, sanguinis verò expui-
tione tempore intermedio, antecedenti-
bus tristitiis, crebris anhelationibus, re-
spirationis interceptione, & quasi syn-
cope tentatas; repetitâ solum sangui-
nis è pedibus detractiione, pristinæ resti-
tuimus sanitati.

Præterea quotquot hoc conflictatæ
morbo fato immaturo fungebantur, post
mortem dissectæ, capitis, pulmonum
ac cordis sinus & vasa admodum san-
guine grumoso distenta magis quam par-
erat, aut in aliis cadaveribus soleret, hoc
in-

infarctu sanguineo suffocari spiritus atque mortem inde accire ostendunt.

Causæ antecedentes internæ *απονεύματι* quæ continentem efficiunt ac movent, sunt 1^o. Sanguificationis vitium, quo tenuior quàm par erat generatur sanguis. Sanguis tenuior fit, vel quia serum debito non separetur modo, ob renum vitia, aut impeditâ perspiratione, restrictis poris, quâ semper laborant hysterica; vel quia talis efficitur, & licet abundè seorsum per urinas aut sudores evacuetur: qui transierit in venis, dilutus, tenuis & mollior relinquitur. Hoc accidit à debilitate concoctionis, in hepate (secundum placita Authorum) in ventriculo (me iudice) malè ingestos cibos comminvente. Unde partes ciborum fibrosæ & crassiores, sanguinis fibras constituentes, intactæ ventriculi laborem effugientes, in intestina seclusæ, cum excrementis, à Lacteis negliguntur. Sola tenuior spirituosa nimium, aquosa & dilucior chyli pars arripitur; ex quâ quid nisi serosus, tenuis & dilutus fluxibilisque exoritur sanguis? A debilitate coctionis non solum tenuitatem

ob-

obtinuit, sed & flatus adjunguntur: quibus laxas magis distendit partes, etiam non incitatus sanguis: cum verò a calore externo aut passionibus commo-
vetur, fulminis instar evolat, discutit ac penetrat; Atque sic ventriculi vitio & tenuis & flatulentus efficitur sanguis, quibus auxiliaribus eum suffocationis hujus authorem esse facile concludamus.

2. Pulmonum laxitas infueta, vel naturalis uti sæpius accidit, vel accidentaria inter procatarëticarum causarum numerum recenseri debet. Cum vasorum fibræ adeò relaxantur, ut sese stringere & contrahere nequeant; unde tenuis ille & flatulentus sanguis in vasa flaccidiora irruens, illa non renitentibus fibris, præter modum attollit, inflat ac distendit.

Mensium etiam retentio inter procatarëticas meritò enumerari poterit, præcipue si retentioni adjungantur tenuitas illa & flatulentia, licet non corrumpatur sanguis. Quibus lunaris sistitur evacuatio, circa præcordia gravedinem, respirationem difficilem, ad motum & laborem pigrityam, lassitudines

dines spontaneas sentiunt, affectus hujus præludia. Suffocatione vero hac convulivâ non affliguntur, nisi tenuitas illa flatulenta, cum pulmonum flacciditate retentioni adstipulatur; multum tum paroxysmi adventum & furorem accelerat sanguinis illa accumulatio.

Animi pathemata in catalogo causarum, suavecotentia etiam externa, aliâque de quibus infra, locum habent.

Causarum hic catalogus ut historiæ observationibus exactè respondeat, sic & damnatum utrum à reatu vindicet; ut vero dubia solvantur omnia, ulterius, an juvantia etiam & nocentia, ut in historia morbi referantur, cum causis hisce convenient, examinandum restat.

C A P. V.

De jurantibus quomodo mali causam illustrent.

QUæ in atrocissimo hoc affectu juvant, etiam sanguinem mali authorem facile suadent. Quæ sunt præcipue sanguinis missio; quæ si in brachiis administretur, minus attulit levaminis, quia sanguinem ad superiora moveri invitat magis. Maxima autem cum utilitate in pedibus instituitur: quo enim longius à corde ac pulmonibus revocatur sanguis, motusque ejus ad inferiora flectitur, qui modo impensius fursum in viscera hæc ruebat, eo thoracis ac diaphragmatis motui sequaciores redduntur pulmones ac cor, quæ liberior efficit systolen, quo sinus ejus ab infarctu illo liberentur, vasibus scilicet copia minori distentis. Nec sanguinis orgasmum solum, atque inde accessuum frequentiam & hæmoptosin iterata

iterata venæ sectio prohibet : Sed & in ipso paroxysmi vigore, cum summa repletionem vasa laborant pulmonum, ita ut in gula n quasi ascendentes lobi, respirationem tollant; unico hoc remedio ad exteriora revocatur sanguis, vasaque deplentur, atque ita liberior statim fit pulmonum motus, & terminatur paroxysmus.

Ligaturæ dolorificæ extremorum, præcipue pedum ac crurum frictiones, uti & omnia revulsionum genera, per clysteres, purgantia mitiora cucurbitulas ac vesicatoria, tam accedentem paroxysmum, quàm crudelia ejus terribilia fomenta fugant, & sanguinis in pulmones impetum refranant.

Ideo prosunt ligaturæ, quia sanguis, qui per arterias in venas effunditur, ob ligaturas ad interiora recurrere nequeat, dum à fasciis constringuntur venæ, & in illis sic retardatur, ut pulmones cordisque thalami quodammodo per arterias inaniantur, placideque fatiscen-
tibus thoracis musculis desidant, qui modò inordinato sanguinis affluxu nimium distendebantur.

Cucurbitulæ extremis affixæ idem efficiunt

De Hysterica passione. 43

efficiunt ; violentiâ enim attractione , sanguinem in minoribus & cutaneis venis retardant, ut præceps ad interiora refringatur motus. Si verò nammis aut thoraci applicentur, respirationis difficultatem, hujus affectionis præludium, etiam in sanis pariunt, quia hoc modo sanguinis motus ad pulmones entrumque acceleratur.

Quæcunque sanguinis orgasmum recanare, illumque increassare poterint medicamenta, plurimum juvant ; ideoque largior aquæ frigidæ haustus, dum per Oesophagum transit, ob arteriarum majorum vicinitatem æstum sanguinis contemperat paulisper, & adventantem omninquam paroxysmum retundit. Item agit vitrioli stipticitas sanguinem figendo, cohibendo, & vasorum bases stringendo, & contrahendo, unde distensionem ab irruente sanguine adeò obnoxia non sunt : eaque de causa specificum creditur in hac & Epilepsia medicamentum. Opiata etiam omniâque arcosin habentia, nisi illa quæ spiritibus igneis abundant, sanguinem indunt potius & accendunt, uti vinum & aquæ fortiores spirituosæ. Quæcunque

cunque verò somnum placidè inducant
& sanguinem figunt, huic adversantur
malo.

Bezoartica omnia & alexipharmaca,
quibus à centro ad circumferentiam te-
nuiores sanguinis partes & vapores ac-
censì per diaphoresin educuntur, sudore
erumpente plurimum juvant. Qualia
sunt corallia, succinum, Margaritæ,
ruta, lapis Bezoar, castoreum, &c.
Quorum spiritibus alexipharmacis cor-
dis refocillantur vires; ut copiosius
sanguinem æstuantem effundat; vaso-
rum etiam fibræ spiritibus recreantur &
stringuntur, ut fortius se contrahen-
tes, irruentem sanguinem non tam fa-
cilè admittant. Partes item sanguinis
tenuiores, serosi, & stitulentæ illorum
calore benigno in minimas inciduntur
particulas, & ad extrema fugantur, at-
que sic Diaphoresis promovetur, ut
transpirantibus particulis tenuioribus
sanguinis inde diminuatur copia, re-
tardetur præceps ad interiora incur-
sus, & pulmones cæteraque vasa inde
depleantur.

Fermentationi etiam humorem ad-
versantes, illos & quietos reddunt, &
ingratam

De Hysterica passione. 45

ingratam in ventriculo aciditatem (quâ multum augetur fermentatio in venis, satiusque ubertim excitantur) compe-
tere & indulcorare soleant. Unde san-
guis minus flatulentus, modestius in
analibus circulator.

Graveolentia naribus admota, vicem
obtinuerunt remedii: sicuti & suaveo-
lentia pudendis; cujus administrationis
sum, non sine causa suspectum habe-
mus. Cum Plinii errori (nimirum
terrum esse animal, quod ex propria
voluntate movere poterit, ac odoribus
sciebatur) patrocinari videtur de sua-
eolentium naturâ, & quid boni vel
mali huic affectui contribuant, infra
eclabatur. Fœtida autem ideò auxi-
um præstant quia sulphure narcotico,
quo maxime abundant; & à quo grave-
olentiam acceperunt, spiritus, sangui-
nem & humores figunt, & furorem cõ-
escunt. Hujus classis sunt plumarum
incensarum ac cornuum odor, castorei,
succini & asæfætida halitus; tabacci fu-
us, &c. quæ cum maximè graveolent,
opiam sulphuris narcotici, spiritus ac
umores figentis, & orgasinum cohiben-
s, fatentur.

Ab

46 *De Hysterica passione.*

Abdominis utrinque compressio le-
yamen adfert ; ut uteri corpus ascen-
dentis deprimatur, asserunt mulierculæ.
At cum matricem immotam supra de-
claravimus, non eo nomine expectatur
auxilium. Abdominis verò compressio
ideo valet, quia inde compressa valide
intestina, Diaphragma sursum violenter
impellunt, unde fibræ ejus à frequen-
tibus & spasmodicis contractionibus
non lacescuntur : & thoracis capacitate
diminutâ, pulmones compressi sangui-
nem quodammodo quasi expuere co-
gantur, fuliginesque retenti expirant ;
atque sic contemperato sanguine, &
depressis pulmonibus, quiescunt &
symptomata.

CAP.

CAP. VI.

*Quæ in affectu hoc nocent morbi
causam denuntiant.*

Quæ nocent & affectum hunc
concitare solent non minus
sanguinem accusant.

Suaveolentia vel in accessione vel
extra ferre nequeunt : imo sæpè hujus-
modi solummodo odore malū incitatur.
Moschus & Zibetha præcipue , aliaque
hujus classis caput gravare dicuntur,
& affectionem hystericam promovent.

De Moscho refert Sennertus ocula-
tissimus , si accepto vulnere in thorace
nullus effluat sanguis , isque in pectore
retineatur; æger granum unum moschi
retineat sub linguâ , ita enim statim
sanguis fluere incipiet , quod nonnulli
pro secreto habent. Generosum quen-
dam sexagenarium & amplius novi, qui
ex moschi , ambrae aut hujusmodi vel
cervi odore, statim de dolore capitis in-
signi,

48 *De Hysterica passione.*

signi, non sine narium hæmorrhagia leni-
niendo, conquereretur. Affectuum ho-
rum authores esse suaveolentia constat:
at unde virtutes hæcce acceperunt exa-
minare non foret inutile.

Ex observationibus prædictis à san-
guinis fusione fieri credamus: tenuiores
enim biliosæ & igneæ suaveolentium
particulæ cum sanguine ac spiritibus
admistæ, ebullitionem ac fermentatio-
nem conciliantes, vasorum distensio-
nem, atque inde gravedinem & dolo-
rem causant, & hoc primò in cerebro
percipitur, ubi odores primò apprehen-
duntur, unde capitis dolor primò affli-
git: Inde deorsum versùs cor ac pul-
mones, sanguis particulis hisce inquinatus
per venas recurrens totam con-
taminat massam, ubi vis illam fun-
dit; unde circa cor ac pulmones, ubi
naturaliter incalescit, odoribus hisce
fusus, conflagratio accenditur, ut ab
æstuanti ejus furore etiam pulsus va-
riatur, intermittit ac cor ipsum tre-
mit, laxæque pulmonum fibræ impen-
sius inflatæ & distentæ copioso ac
æstuanti infarciuntur sanguine, ut im-
mobiles penè labor reddat; inde sus-
focatio

Locatio hæc petit originem: præcipue
i sanguinem sequacem, tenuem, flatu-
entum & copiosum invenerint hæc sua-
volentes particulæ; uti in mulieribus
holecicis præcipue fieri solet. In mas-
culis autem nonnullisque fæminis, qua-
rum pori sunt patentiores, ac diaphore-
s maior, nec sanguis ad liquefactio-
em sit tam facilis; igneæ hæ particulæ
acilè expirant, neque tanti incendiū
int authores, neque inde tam gravia
enerant symptomata.

Atque hoc illorum, præcipue Mo-
chi & Zibethæ naturæ suadere pote-
nt, cum ex animalium excrementis,
ita sanguine bilioso putrefactis, ori-
nem petant. Moschus ex abscessu
rope umbelicum animalis cujusdam
ossuit, referente Gesnero, vel uti
mercator quidam regionibus istis, unde
obis transportatur, faciens comther-
a, mihi narravit, ad hunc modum ef-
fitur.

Incolæ (dixit) regionis cujusdam in
dia orientali, cum animal istud (da-
s non absimile) invenerint: primò
nibus diu insequuntur venaticis, de-
de cum persecutionem ultra ferre ne-

D

queat

queat canum, fessum & anhelans plagis abunde excipiunt, donec tota cutis sanguine grumoso à verberibus canumque moribus maxime infletur, & intumescat; tum cum incalescat adhuc, pellem ubivis attollunt & ligaturis strictioribus illam cum sanguine illo grumoso incluso circumligant totum in nodos; deinde statim vivente adhuc animale, abscissis nodulis sanguine illo plenis, pro moscho optimo reservant, qui nobis sic in bursis coriaceis, ut ab animali abscindantur, à mercatoribus transfertur.

Zibetha est exudatio hujusmodi humorum in capsulam quandam, prope testiculos cujusdam animalis, à natura institutam, unde eruitur ad usum.

Atque sic Moschi & Zibethæ generatio quocunque modo sive à profluente abscessu, sive à grumoso sanguine crudelium incolarum verberibus collectofiat; à sanguine accenso & bilioso petunt originem. Hoc non tantum temperamenti similitudo persuaserit, cum & bilis & moschus, uterque calidis particulis abundant. Sed quia odor utrisque multum similis invenitur. Bilis si distilletur aut

De Hysterica passione. 51

aut concoctione ulterius elaboratur, moscho æquiparatur odore, quæ odoris similitudo, naturæ etiam convenientiam ostendit. Cum itaque de naturâ bilis participant hæc suaveolentia; mirum non est si igneæ horum particulæ (ob cognationem facile avideque admissæ) partes sanguinis jam tenues & biliosas iundant magis, & accendant. vapores, qui humido corpori similitudinem obinuerunt, facilius se insinuant, spiritusque prodiderunt.

Ætatis, Hypocausi aut balnei calore intensiori excitatur etiam malum hoc pestiferum. Cum ab æstu nimio & exandescenti, incalescit nimium sanguis attenuatus, & fluxilis; unde spacium amplius, quo contineatur, petens, in asa pulmonum majora ac laxa proruit: uæ cum à spongiosa carne investiantur, istensioni facile cedunt; Donec ponere nimio gravati diaphragmatis motum ulterius sequi nequeant.

Nec in minore periculo sunt, quam pori multum frigore constipantur; æcipue si tenuis & flatulentus sit sanguis: hinc humoribus serosis magis abundans, ob vapores retento facilius

attenuatur & accenditur.

Sanguinem hunc tenuem, biliosum & flatulentum attenuant etiam & accendunt violenta exercitia & motus inordinati; ita ut sæpe affectus hujus existant authores. Nonnullas novi fæminas à motu solum violentiore sub sole, in ætate, crudeli hujus affectionis furore statim prehendi.

Quæ diu ac sæpius infantulos lactarunt huic, affectui multum obnoxia inveniuntur. Fæminam novi quæ cum per annos penè viginti vel gravida vel nutrix vixerat, tam facilem ac violentum sanguinis fluxum crebriori lactatione versus thoracè conciliaverat, ut partus posteriores, tristitiæ, anxietates, cordis palpitationes, gravedines & lassitudo spontanea (hujus affectus prodromi) semper concomitarunt. Continua enim lactatione sanguinis motus (pæcipue si tenuis ac fluxilis nimium fuerit) versus cor ac pulmones concitator revocatur; adeo ut partes illæ non minus aliquando copioso gravantur sanguine, quàm si cucurbitulæ mammis affigantur, quarum violenti attractione, (uti supra monuimus) respirationis difficultas etiam in sanis promovetur.

C A P.

CAP. VII.

Quomodo passiones affectum hunc incitaverunt.

Quavis vehementi passione si commoveantur, recrudescit malum; turbato inde & accenso sanguine: quod modo sequenti fieri existimamus.

Spiritus animales per externos sensus, objectorum species tam gratos, quam ingratos animali recipientes, communi sensui statim communicant; ubi secundum cujusvis naturam excipiuntur. Si sub specie boni, avide & comiter; si autem sub mali specie ingratae sunt, cum improbatione & quasi nausæa, ac sollicita totius provisione admittuntur; præcipue autem partium quas principes vocant. Inter has vero Cor præsertim respicitur; quod ἡ δὲ τῆς ἐμψυχῆς δεξιμῆς, καὶ ζωῆς. Focum calidi innati, ac vitæ fontem nominant; ad cujus nutum ac bene esse

D 3

reliqua

reliquæ moventur omnes; ad cuius præ-
 servationem ceteræ conformantur par-
 tes. Sensuum organa speculatorum of-
 ficia huic præstantia, amicos ab inimicis
 discernunt; interim sensus, animæ fa-
 cultates, satellites ac Manipulares, in-
 telligencias & detectas species probant;
 ac cum aliis prius admissis comparant.
 Qui ex continuata experientia & noti-
 onibus anticipatis in memoria repositis;
 sedulaque nuper admissarum compara-
 tione, cum repositarum natura ac affe-
 ctibus, de illarum conditione, an grata,
 vel ingrata, toti vel alicui parti sint pro-
 futura, dijudicant. Scientiam hanc ex-
 perientiâ acquisitam fuisse; animalium
 tabulæ rasæ (uti animam vocat *Aristote-
 les*) indicant. Quorum sensus commu-
 nis de rerum naturis experimentaliter
 & scientifice judicare nequeat; neque
 exemplaria ex repositoriis memoriæ,
 adhuc vacuis, & quasi rasis petere possit;
 atque ideo omnia tam bona, quam ma-
 la, avide æque appetit & amplectitur,
 aut averfatur. Flammam non minore
 dilectu, quam papillam in fauces in-
 gerit infans, & objecta amabilia non mi-
 nus formidat, quam terribilia & inimi-

ca : non potens discrepantes distinguere facultates. Est enim in tenella hac ætate sensus communis ac imaginatio instar novæ alicujus advenæ in mundo, qui aut miratur objecta sibi nova, aut ab iis perterretur, & perturbatur, & quò pauciora in memoria reponuntur experimenta, eò passionibus moveri procliviores redduntur. Atque ideo post pueros & infantes, fæminæ promptius passionibus sunt obnoxia: quia experimentis paucioribus instructæ, recte de naturis rerum dijudicare, vel actiones comparare nequeant. Atque ideo facile passionibus aguntur, & ad insultus hosce vel epilepticos inde sunt proniores.

Objectorum natura communi sensui, comparatione facta jam nota cuivis parti, præcipue cordi, ministris suis mediantibus (scilicet spiritibus,) quasi Accis Domino, & præfecto, certam objectorum notitiam, una cum subsidiariis copiis transfert, & ex diverso spiritus distribuendi modo, quam objectorum ipse admisit apprehensionem, cordi communicat; ipsosque in illo motus, quos passionibus vocant, excitat. Ex. gr. si

objectum speciosum & amœnum appareat ; avide & cum gaudio amplectitur sensus , unde statim copiam spirituum per sextum par nervorum Cordi profusius mandat , ventriculo , hepati , pulmonibus , aliisque non neglectis partibus. Quorum pleniori accessu , fibræ multum distentæ sunt , ac qualibet promoveretur actio. In corde cujus fibræ spiritibus impregnata motum evidentiorum edunt ; subsidiorum effectus clarius manifestatur. Quo enim plures communicantur spiritus , eo vehementius contractæ fibræ sinus ejus constringunt , inclusumque sanguinem in arterias & pulmones propellunt ; qui in arterias effunditur , pulsus varietatem passionibus conformem ; qui in pulmones , respirationis differentiam constituit , ut in grati & amabilis objecti receptione , larga & æqualis sit spirituum transmissio ; Cordis fibrarum magna contractio & constans , ventriculorum ejus contractio proportionata , larga & ordinata sanguinis emissio , pulsusque magnus sequitur , tardus & rarus (cum magnitudo necessitate urgenti satisfaciat) quem Medici lætitiæ signum indicant. Iffe-

ctus

De Hysterica passione. 57

Etus motum hunc cordis ac spirituum consequentes sunt copiosa sanguinis profusio in singulas arterias, præsertim pulmonum; qui inordinatâ hac plenitudine & calore abundantiori, ad motum frequentiores sollicitantur, unde anhelationes, & suspiria; & si sequacem invenerit sanguinem, vasaque pulmonum laxa satis ad distentionem apta, suffocatio frequenter hæc, imò mors sæpe insequitur.

Si admissæ species objectum ut malum phantasiæ ostendunt, vel ut malum irrefragabile, horrore plenum & toti perniciosum apprehendit, & passionem illam quam *timorem* vocant, generat; vel ut malum cui propriis viribus, aut alienis adversari & resistere poterit, intelligit unde affectus ille quem *irram* nominant exoritur. In timore spiritus fixi ab inopinata mali eruptione, & exitu dubio consternati, renuisse & languide cordi transmissi, motum debilem & rarum excitant, adeo ut sanguis in pulmonibus & cordis sinubus restagnans, quodammodo concrescit, unde syncope, ipsaque mors non rarò supervenit. Sin autem mali horror non intendatur, spiritus

ritus copiosa transmissione defectum compensantes, imperuose irruentes, sanguinem colliquant & exagitant, pulsum reddunt magnum & frequentem, & in pulmones laxos copia excandescens propellitur sanguinis, eosque ultra modum extendit ac graviores quam ut à debili adhuc diaphragmatis constrictione commoveantur; unde suffocatio hæc insequitur inevitabilis.

Si objectum ut resistibile apprehendatur, ira excitatur; phantasia omnes suas exerit vires & spiritus, subsidia copiose & frequentissime cordi transmittit; & pulsus inde magnus, celer,

Fra quomodo creber ac vehemens exci-
affectedum hunc tatur. Cujus repetitis icti-
generat? bus larga sanguinis portio
 in pulmones propellitur, qui si æquali
 ac proportionato diaphragmatis motu
 non lacunentur, si sanguis tenuis &
 flatulentus sit, excandescens copia
 spirituum impregnatus, instar lactis e-
 bullientis extumescit, ac pulmones, ut
 antea dictum est, gravat & immobiles
 reddit, & insequitur paroxysmus hyste-
 ricus.

Desipientia causam in affectu hoc ad
 spirituum

spirituum motum inordinatum, ac perturbationem in ipso fonte, scilicet cerebro, & sensuum organis referre debemus; cum enim à nimia sanguinis fermentatione volatiles nimium & excalescentes generentur spiritus, aut si à longiori pugna fermentatione peracta figantur nimium, aut ad alia peragenda sevocentur, magnumque in contractionibus convulsivis & gesticulationibus irregularibus illorum fiat dispendium: mirum non est si rite semper de rebus gestis non dijudicent, & omnium vel plurimorum circa ipsas acta ignorent. Cerebrum insuper calidiori illo incensoque distentum sanguine; & ingeneratione, dispositione & distributione spirituum turbatur, adeo ut spiritibus etiam accensis, delirium non raro paroxysmi hujus fit comes frequentior. Aliquando vero cum levior sit spirituum conturbatio, & facultates internæ minus commotæ fuerint, ipsis quod in paroxysmo accidit, nihil nescium erit, nullaque insequitur desipientia aut læsio memoriæ. *Sola quies cerebri sapere facit, prudentiam subministrat, & intelligentiam causat.* Hip. lib. de morbo sacro.

Atque

Atque sic Hysterica affectionis causas & effectus per historiae observationes examinavimus. Nihilque arduum & difficile in illarum explicatione levi pede pratergressi fuimus: restat solummodo ut dubia nonnulla, quæ veritatem hujus rei aut obscuram aut ancipitem reddant, diluamus. Et primo hic quæri poterit, Si à concitatori sanguinis motu, nimiaque effervescencia pulmones distendentis fiat hysterica hæc affectio,
10 Cur solummodo faminis contigit?
20 Quare in omni sanguinis ebullitione & febribus, & quando pulsus omnes hæc variationes subit, non invadit?
30 Quomodo spiritus animales in cerebro & nervis repositi & conducti, in sanguinem ceterosque humores, & in ipsa corpulentiora musculorum corpora agere poterint? 40 Quomodo spiritus animales in motibus hisce inordinatis & irregularibus, etiam ad certas & determinatas partes disponuntur & pre-
pelluntur?

CAP. VIII.

*Cut femina solum hoc cruciantur
malo.*

Masculis non competit hæc affectio licet symptomata hujus quamplurima Epilepticis, convulsis, Hypochondriacis, aliisque tam masculis quam fæminis sæpe accidunt. 1^o Quia major sanguinis portio cæteris paribus fæminis conceditur, quam maribus, uti Menstrua testantur pro fluxu, quorum fluxus per dies aliquot nunc diutius perpetuatur. Et in secundo septenario id, est, anno decimo quarto plerumque, nunc undecimo eumpentes, ad septimum usque septenarium durant Menses: & post quinquagesimam ut plurimum subsistunt, cum scilicet calor innatus tantam sanguinis opiam non generat. Quæ sanguinis redundantia si non rite statis temporibus per uteri vasa evacuetur, aut acciden-
rali

tali retractione recurrat; ad vasa majora & laxiora retrahitur, eaque distendit. Mares vero tanto solum gaudeant, quantum ad partium nutritionem sufficiat, atque ideo malo hoc non affliguntur. 2^o Fæminarum sanguis tenuior est. Viri calidiores sunt & præ fæminis spiritibus abundant, unde plura excrementa ad cutem & extremas partes protrudunt; quæ in fæminis in sanguine reservantur, illumque tenuiorem & dilutum efficiunt magisque fluxilem reddunt. 3^o Ob imperfectiorem concoctionem magis flatulentus muliebris semper invenitur sanguis. Unde ob tenuitatem facilius incitatur, ob copiam magis gravat, & ob admixtos flatus magis distendit ac citius funditur.

4^{to} Mulieres pulsu debiliore fruuntur quam viri; unde sanguis ad extrema diminute propellitur, ut vasa interiora ejus redundantia distenta; præcipue in venis pulmonum majoribus & relaxatis, magis quam in Maribus graventur & dyspnæam ac suffocationem cito efficiant.

5^{to} Præterea fæminea Corpora sunt (referente Hippocrate) *δυσσπόμενα* *νίκ*

per

De Hysterica passione. 63

perspirabilia; molliores & laxiores sunt mulieres carne & cute. Unde ob flacciditatem & concidentiam pororum in carne, quia vasa nimis compressa sunt, haud libere perficitur in extremis sanguinis circuitus, & ob cutis permeabilitatem difficilem, partium serosarum & flatuum impeditur transpiratio. Rarius autem magisque foraminibus pervium est corpus virorum; & inde facilius & liberalius sudat, nec non penetrabile frigus flante Aquilone minus tolerat, quam fæmineum. Quarum pori constricti vapores ac flatus retinent; unde sanguis tenuior, & ad motum proclivior efficitur: ut vel levi occasione rarefactus, majora in pulmonibus vasa adoriatur, eaque distendat; qui ob pulsus debilitatem, tam facile ad extrema propelli nequeat, sed ad interiora retractus angustiam hanc & suffocationem generat. In masculis pori patentiores sunt, fuliginesque sanguinem attenuantes & proritantes frequentiori exercitio absumentur & expirant.

Viragines etiam aliaque plurimæ, quarum vel porosa cutis facile vapores emitit, aut benignior corporis tempera-

ratura

natura talem non generat sanguinem, malo hoc non infestantur. Illæ vero pathemate hoc frequentius laborant, quarum temperamentum calidius sanguinem æstuantem ac tenuiorem creat, nec genitus per diaphoresin ventilatur, aut modo consueto non purgetur. Iis autem contigit hic affectus, quibus vel constans vel anticipata mensium evacuatio crudelem hunc reatum à sanguine vindicare videatur; cum vel in ipso profluvii tempore nonnunquam excruciantur. Quia à retentione fuliginum, sanguis jam tenuior, in hac commotione lunari fusus magis, & accensus, & in quamvis partem moveri inclinabilis, facile, vel à passionibus irritatus, vel accidentali pulmonum distentione allectus, recurrere & spatium ampliorem in pulmonibus occupare suadetur: præcipue si evacuatio consueta fusioni non proportionetur. Plures novimus fæminas, quibus ætate juvenili, diu mensium suppressione laborantibus, cum per uteri vasa postea natura evacuationem conata fuerit, quavis levi occasione, aliquando nulla evidenti causa, in ipso profluvii initio, sanguis in momento pane ad superiora recur-

recurreret; neglectisque tramitibus ordinatis, vel pulmones & cor aut cerebrum impetuose peteret. Imo quamplurimæ perpetuis Cephalalgiiis dum fluant menstrua, à fusione sanguinis nimia vexantur.

Præterea cum fæminæ passionibus magis sint subjectæ, mirum non est si illorum effectibus magis obnoxia redduntur. Muliebris calor languidior & pauciores & debiliores generat spiritus, qui ut objecta male plerumque apprehendunt, sic & debilibus argumentis phantasiæ & rationi satisfaciunt: atque ideo majus in illas dominium exercent passiones. Quomodo passiones sanguinem ac spiritus conturbant atque huic affectioni ministrant, supra ostensum est.

Sed hic quæri poterit, cur pulmones distensionem huic à sanguine fervidiore magis aliis partibus sint obnoxia?

Pulmones ideo magis copia hac gravantur, quia in illis ampliora sunt vasa, parenchymate dilatabili & spongioso circumducta, adeo ut facilius in eorum notu continuo distendantur; dum cætera viscera minoribus vasibus strictis-
que

66 *De Hysterica passione.*

que parenchymatum cancellis conclusis gaudeant.

Denique Mulieres malo huic proniores pulmonum gratia dicantur : quia in feminis angustius pro illis in thorace à natura conceditur spatium , quam viris ; quorum thorax multo amplior distentis & inflatis pulmonum lobis facile cedit. In feminis vero quod sint arctioribus constricti cancellis, cum accidentali quacunque sanguinis fusione magis quam par erat extendantur vasa; exigua pectoris cavitas pulmones inflatos ita comprimit ; ut nisi septum largiori & magis frequenti instaret motu, spacium distensioni illorum proportionatum non inveniretur. Cum vero tenuior illarum sanguis subito rarefactus nimium pulmonum vasa infarciat, propter cavitatis angustiam relaxato diaphragmati non cedunt pulmones : quia tali temporis intervallo depleri nequeant , ut ascendenti septo locum darent. Hinc ut fuliginum sanguinisque furentis excandescentiam tam in pulmonibus quam in corde evitet natura , Septum rursus ad sui ipsius contractionem , ut frigidum inspiret, sollicitat. Atque hinc augetur infarctus,

infarctus, ac suffocatio sequitur. Quæ omnia à largiori thoracis masculi cavitare antevertuntur.

C A P. I X.

*Quare in omni sanguinis fusione
& febribus non invadit hy-
stericus paroxysmus.*

IN febribus non semper excitatur hic affectus (licet convulsio aliquando superveniat) quia sanguis, febrili ardore absumptis tenuioribus ejus particulis incrassatur potius; ut tardiori progressu vasa permeet, non fulguris instar in partes irruat.

Deinde in hoc affectu sanguinis accensio & irritatio subita est; & in laxos pulmonum lobos in instanti pene profluit, eosque cito distendit.

Materia autem febrilis accensa paupersper vitalia affligit, & sanguis in corde accensus non tantum in pulmones irruat, sed & in singulas Microcosmi regiones distribuitur, vasaque omnia æqualiter distenduntur, sanguis ille qui paupersper

lisper excandescit, celeritatem & frequentiam pulsus motui diaphragmatis respondentem excitat; ita ut pulmones frequenti pulsu exantlati & ab infarctu illo instantaneo liberati, non ultra septi regulationem adiguntur, sed ad diaphragmatis relaxationem sponte decidunt.

Convulsio autem febrium tam malignarum quam aliarum comes nonnunquam reperitur, quia à febrili calore cerebrum occupante, spiritus accensi irregulariter & inordinate musculofo generi dispensantur. Cum scilicet vi morbi adeo perturbantur facultates animales, ut spiritus nec dirigere, nec cohibere poterint; sed furiose & subsultim effluentes, nunc hos, nunc illos contrahunt musculos, ac motus in partibus irregulares edunt. Quæ diutius rigida & contracta maneant, si spiritus flatulenti una cum animalibus profluunt.

CAP. X.

30. *Quomodo spiritus animales in cerebro & nervis repositi in sanguinem ceterosque humores & in corpulentiora musculorum corpora agere poterint.*

UT spirituum activitatem in sanguinem, ceteraque corpora cognoscamus, & sic ut tertiam diluamus objectionem, naturam illorum dignoscere ac delineare non inutile foret.

Spiritus animales (de quibus hic agimus) sunt Atomī quædam, minutissimæ sanguinis particulæ igneæ, attenuatæ, rarefactæ, calore ac fermentatione in cordis sinubus exaltatæ, & cum sanguine simul per arterias cerebro transmissæ, ubi per substantiam ejus variis Meandris rivulisque tenuioribus discurrentes, energia cerebri propria elici-

70 *De Hysterica passione.*

eliciuntur, à sanguine separantur, & in meatibus ejus ad usum reservantur. Qui ob tenuitatem igneam vel densissima, magisque compacta corpora penetrare, eaque attenuare, dividere, & distendere queant; ob calorem partes dilatare & fovere poterint; ob activitatem, totum in momento percurrunt microcosmum, & nisi humiditate cerebri contemperarentur, densisque firmarentur membranis, cito evolarent, aut excalescentes singulas animæ actiones perturbarent. Cum parti alicui (purissima prius cerebri substantia depurati) communicentur; in canalibus idoneis, duris, crassis, intus vero spongiosis, nervis scilicet ducuntur. Nervi hi per totam, cui distribuntur, partem in tenuissimas fibras & filamenta divisi & sparsi, singulis particulis illius partis spiritus porrigunt ac distribuunt, quibus copiose si impregnentur fibræ, variorum motuum, ac singularum pene actionum sunt authores. In ventriculi fibras copiose affluentes spiritus, eas distendunt, contractiones inde efficientes, ingestos cibos primo leviter amplectuntur, postea asperius paulo comprimunt, donec

De Hysterica passione. 71

donec tota chyli exprimatur massa. Hepati cæterisque visceribus deducti, calore suo foveant, & sensationem quandam impertiunt, unde propria alimenta distinguere sapiunt. Genitalibus sparsi, calore illic aucto, partes distenduntur; unde copiosior sanguinis affluxus concitatur; quo partes magis intumescunt; tumescit sperma, & ad venerem proicitur. Cordis musculorumque fibris obati; quia carnosiores, laxiores, ac molliores fuerint, nec obliquis (ut in membranis) texturis implicantur, motum conspectiorem edunt; cum illorum fibras impleant, ad latus distendunt, & inde contractiores factæ, partem mobilem fixæ arripiunt; & motus nunc tardus, nunc citatior efficitur, prout spiritus copiosè aut parcius in illas procelluntur. In sanguinem & humores aut spiritus seipsum insinuando, & cum spirituosius particulis uniendo illos turbant & commovent; unde extumescens sanguis aut humor, in quamcunque partem illi cedentem, ut spatium refactioni proportionatum obtineat, tuit. Nonnunquam spiritus partes immo calefaciunt, & relaxant; poros dil-

dilatando ; unde vasa ampliora reddita
facilius majorem humorum admittant
quantitatem, atque hinc caloris ac ten-
sionis majus accedit accrementum ; &
pars excandescens ad continui solutionē
penē intumescit ; inde copiosior afflu-
xus inflammationem accelerat.

C A P. XI.

4^o. *Quomodo spiritus hi designatas partes petunt?*

Quomodo spiritus hi designatas
partes sine deviationē , aut
errore petant, & hanc, non il-
lam agitant , hic inquirendum
est. In convulsivis motibus licet re-
gularitas illa non semper observetur ,
sed promiscuē nunc hunc, nunc illum
distendunt muscūlum. In aliis ordina-
tis autem motibus, cum passionibus i-
rem subserviant , ad locos designatos ,
idque semper accurrunt. In ira vel pal-
let facies, aut intensius rubet ac intume-
scit;

scit ; supercilia stringuntur , & contracta manus vindictam serio minatur. In tristitiâ facies torquetur , oculi obscurantur , fletus, gemitus & suspiria alta, ac crebra insequuntur: Lætitiæ comites sunt hilaritas , risus, oculorum vigor , ac vultus totius serenitas. Pudor erubescentiam , & oculorum dejectionem causat. Concupiscentiæ oculorum coruscationem & priapismum. Metus soboles sunt pallor, fuga ut consternatio ; imo in omni passione, spiritus ad eas præcipuè tendunt partes, quæ passionibus commoventur. Neque motus hi eadem in omnibus animalibus indicant pathemata. Canis quando subblanditur , caudam agit, Leo cum irascitur ; complacentiam indicat elis caudæ erectione ; timorem , ejusdem dejectione Canis. Effectus hi vari ac diversi, passionum comites sunt perpetuæ ; quasi scientificæ , & cum studio phantasia spiritus dirigeret, non accidentali missione contingeret: atque ideo directorem seu conductorem eorum in sequentibus explorare debemus.

E

Præ-

74 *De Hysterica passione.*

Præclarus dominus K. Digby horum effectuum causas ita demonstrare conatur. Cerebrum (inquit) objectis affectum, cordi statim per nervos, spiritibus, à corde prius transmissis, plenos, illa communicat, unde spirituum circa cor fit contractio, vel dilatio, secundum objecti naturam, & pulsus, vel augetur vel diminuitur. Hinc cerebro vicissim varia sanguinis & spirituum per arterias sequitur transmissio. Spiritus hi per cerebri Meandros discurrentes, humido ejus effluvio commisti & contemperati, tandè in ventriculos cerebri ex plexu choroeide expirant; ubi gravitantes, exinde in spinalem medullam decidunt; unde in cæteros nervos, vel antecedentes prementes, vel ipsi dilabuntur, & omnium motuum ista compressione fiunt aut hores.

Quod ad designatas partes sine errore tendant, ex varietate semitarum, à introitu in nervorum circulis oriri putat: unde spiritus secundum diversa qualificationes, vel admittuntur, vel repudiantur; aut quia cordis contractiones vel extumescentiæ nervos alio quo

De Hysterica passione. 75

uos claudant, alios referant, & in
viritum admiffione electionem hanc
efficiunt.

Sed pace tanti viri non fic dubia e-
dicta profternentur.

10. Enim fanguis, non fpiritus à
fanguine feparatus à corde cerebro de-
mandatur; materia ex qua efficiuntur à
corde transfertur: ipfi fpiritus in cere-
bro à fanguine feparantur, & pofttea cor-
porum per nervos communicantur.

20. Ex plexu choroeide non expi-
ant fpiritus in ventriculos cerebri, fed
à allefto fanguine in fubftantia cere-
bri, igniculi hi tenuiores feparati in
ad ufum confervantur. Ventriculi
item nec illos retinere, nec ad nervos
distribuere poterint. Cum à finibus
fice ad palatum retròque verfus cere-
bellum ad glandulam pinealem ex-
orfum patent exitus infigniores: un-
e hic contineri ac confervari neque-
t.

Nervorum etiam origines à cerebro
oducto, feu à cerebri & cerebelli
occeffibus unitis ducantur omnes, non
ventriculis: atque ideo in nervos in-
migrare nequeant fpiritus. Ventri-

culorum usum esse cerebri excreta, sero-
 fas sanguinis partes, à reliquo in nutri-
 tione separatas colligere ac retinere, a-
 libi denunciavimus.

Præterea in spiritibus tantam inveni-
 ri gravitatem qua pressionem illam, ac
 tam veloces, eosque diu continuatos
 motus efficiant, haud possibile videtur.
 Gravia etiam in descensu equalitatem
 quandam, cum in eodem versantur me-
 dio servant, neque nunc tarde, nec ce-
 leri agitantur motu; & è contra à præ-
 cipiti, ac rapidiori cursu statim tardiori
 sistantur gressu.

Spirituum motus etiam non semper
 deorsum fertur, ut gravitate agant, sed
 ad latus, aut sursum non minori
 velocitate advolant, quam deor-
 sum. Cytharistarum aut chelystarum
 digiti sursum elati, non tardiori a-
 guntur passu, quam p rofugorum
 pedes.

Spiritus etiam eodem nervi furculo
 ad musciculum prolati unico illo musculo
 diversos excitare poterint motus. Digi-
 ti quatuor distenduntur ab extensor
 musculo, ossis humeri tuberculo exter-
 no affixo, in quem unicus tantum ner-
 vorum

De Hysterica passione. 77

Vorum furculus (scilicet primus ab interno ramo quarti nervi brachio exportecti) unde spiritibus impregnetur, implantatur; a unico etiam musculo, pari nervorum numero animato flexuntur. His tamen musculis, digitos varie agitatur cytharista, primum mobilem tenet, passu tardiori tertium, quam citissime secundum digitum ad libitum etiam movet. Index seu primus digitus in ira, seu comminatione porrigitur, medius in derisione, & infamiae nota habetur,

(---*Medium quo ostenderet arguere*---)
ceteris omnibus contractis & immotis. Quam in digitorum motu varietatem, in compressione spirituum ob gravitatem solam conciliatam oriri multum dubitamus: cum iidem spiritus per eundem transmissi nervulum ope unius etiam musculi, diversos imo contrarios, motus edere nequeat.

Deinde in dissectionibus anatomicis nulla in nervorum spongiosis canalibus reperitur varietas, qualis à nobili autore excogitatur.

Neque magis probabilis erit illa nervorum clausura, ex pulsum varietate

orta. Cum inter nervos & arterias nulla sit communio ; longeque sæpius à seinvicem progressi , neutri open ferre , vel alterutrum turbare poterint.

Præterea motus nonnullarum partium, præcipuè celeritas motus, crebris experimentis & longa assuetudine acquiritur ; qui ab ordinario spirituum affluxu (multo minus à nervorum clausura) non expertis nullo modo perfici potuerint , qualis est celeritas illa in chelistarum digitis. Necnon in lusu illo puerorum , quo una manu pectus perfricare, alterà frontem percutere conantur. Licet intentio & imaginatio valida satis, & ad morum perficiendū maxime sollicita fuerit ; non assueti tamen, vel ambabus & pectus & frontem perfricant, aut ambabus percutiant manibus, consentientibus spiritibus ad eosdem in utraque manu musculos transmissis. Neque multum hic aberrare videar, si quemlibet animalis motum voluntatis dictamen insequentem experientiæ prolem appellem.

Hisce circumsepta difficultatibus prædicta opinio cum sit, ad ulteriorem horum motuum causæ disquisitionem facile,

facile, non meliori forsan successu, persuadebimur.

Spirituum itaque in motu directorem alium quam *animam* ipsam ex modo & mediis agendi elicere non possumus. Quæ a Philosophis *tota in toto, & tota in qualibet parte* existere dicitur. Existentiam autem illam & habitaculum in spiritibus stabiliri, per singulas corporum particulas dispersis judicamus. In tugurio enim materiali & corpulento, inter partes tangibiles incarcerari, minimè cum spiritali animæ essentia convenit; neque revera sine mediis, alter in alterutrum immediate agere poterit; secundum axioma illud Philosophorum. *Materialiale non agit in immateriale*. Spiritus itaque qui exactissima in corde ac cerebro præparatione, ac subtiliatione omnem omiserunt tangibilitatem, media fiunt idonea quibus anima in tangibiles corporis partes operari, & corpus vicissim suas animæ communicare affectiones poterit. In quodcunque itaque corporis latibulum peragantur spiritus, animam inseparabilem & dirigentem semper comitem

obtinuerunt. Quæ nullarum partium
ignara, semitarum singularum devia-
tionibus & labyrinthis satis instructa
mirum non est, si in omnes quas veli-
tramites sine errore aut deviatione se-
quaces ducat spiritus; eosque ad libi-
rum in furorem exagitet, aut reprimat
rursus & demulceat.




DE

Affectiōne Hypochondriaca.

EXERCITATIO II.

CAP. I.



Affectio Hypochondriaca cum uterinæ suffocationi effectus non absimiles sæpe producat, cum illa non immerito cognationem habuisse, antea pronuntiavimus. Imo sæpe in mulieribus ita confunduntur symptomata, ut à peritissimis vix distingui poterint medicis, Cujus naturam ab intempe-

E 5 ris

82 De Affectione Hypochondriacæ.

rie calidâ & siccâ vasorum mesenterii, hepatis, & præsertim Lienis dependere vulgò æstimatur; atque ideo semper Lien male audit, & omnium inde symptomatum emergentium author esse creditur. An vero tantorum reus sit facinorum, hic ex historiâ affectionis hypochondriacæ brevi inquirere operæ pretium fuisse animadvertimus.

Affectio hæc ex syndrome plurimum concinnata symptomatum; in temperamentis præcipuè cholericis habitu corporis tenuiori melancholico dicto furere cernitur. In ætate media circa annum trigessimum, usque ad vitæ nonnunquam terminum producta, plerumque invadit; pueros aut adolescentes rarius aut nunquam.

Mares magis ac frequentius affligit quam fæminas, in his verò magis incurabile habetur malum; cui sæpissime supervenit uterinus affectus, aut conjungitur; scorbutus his sæpe jungitur, & fluor albus in fæminis.

Morbus non minus antiquis, quam neotericis notus medicis: hoc licet sæculo frequentius grassatur, adeò ut in omnium ore & scriptis inveniatur, ac
pro

De Affectione Hypochondriaca. 83

pro communi quadam calamitate, & seminario quodam omnium penè morborum habeatur. Ab Hipocrate *αἰσχυρὸς νόσος* *siccatorius* dicitur. A recentioribus Hypochondriaca affectio, quia præcipua symptomata in Hypochondriis laborantes excruciant; quæ sic a scriptoribus ordinantur. In partibus naturalibus conspiciuntur hæc.

10. Ventriculus semper se male habet, & multa circa eum mala apparent symptomata, cibos ferre nequit, sed male coquendo, in materiam nunc aqueam, acidam, acerbam, ponticam, nunc viscidam mutat. Quæ in ventriculo relictæ, nunc sursum repit, & os ac linguam saliva & humiditate aquea copiose replet, ut continuò expuere cogantur ægri; sæpe etiam vomitu rejicitur pituita viscida, & acida. Hæc sæpe in ventriculo humorum præcedit ebullitio, & inde flatuum copia excitatur, qui miro quodam boatu continuo eructantur; vicinas verò distendunt partes, scilicet Hypochondria; ac tantam circa præcordia angustiam & anxietatem concitant; ut ægri interdum in lypothymiam incidant. Quæ

non

84 *De Affectione Hypochondriacâ,*

non prius demulceantur symptomata, quam quod in ventriculo fluctuat, vomitu rejiciatur; quod verò tenuius & vaporosum in venis reperitur, per poros discutiatur; quod interdum cum horrore febrili accidit, quem calor, cum sudore viscido evanescens sequitur.

Dolores etiam ventriculi adsunt vehementes (qui nonnullis ad dorsum usque procedunt, ut ab ægris, imo incautis medicis sæpe pro nephriticis habentur) qui interdum jejunos, & interdum etiam à cœnâ molestant; nec cessant prius quàm cibos crudos & pituitam acidam, ferventem, viscidam & sibi coherentem vomitu rejiciunt. Cum jejunos anxietates & dolores hi affligunt, cum nausæâ & perpetuo vomendi desiderio torquentur miseri; nec quidquam speratur levaminis, priusquam potus vel ciborum ingestione refrænatur ebullientium humorum furor.

Alvus semper adstricta est, & pigre sua deponit excrementa; unde flatus retenti abdomen & hypochondria tendunt; dolor, fluctuatio, rugitus & murmura in sinistro latere audiuntur:

Fæces

De Affectione Hypochondriaca. 85

Fæces bubuli stercoreis non absimiles, plerumque nigras, terrestres, limosas & quasi argillosas reddunt, pituita viscida & tenaci permixtas, quas non nisi acrioris medicamenti ope facultas expultrix rejicere potest. Interdum tamen si humores acriores reddantur & exasperentur, fluxus excitatur alvi, nunc biliosum humorem, nunc melancholicum admixtum habens.

Æstus in hypochondriis, & quasi inflammatorius affectus molesto ardore & fervore interno, in hypochondrio, nunc uno, præsertim sinistro, nunc utroque egros affligit. Qui se magis exserit, cum ingestis aliquo modo agitentur humores; cum largiori potu, aut multiliciborum varietate infarcitur venter: tunc malæ præcipue accenduntur, & tota facies rubore affunditur, & incælescit.

Urina nunc tenuis est, paroxysmi instantis indicium, sine sedimento & incoacta; plerumque turbida, crassa, atra, acris, interdum fætida. Quibus urinis sæpe materia adusta, salis participes, quam tartarum appellant, copiose excernitur; & arenularum rubrarum instar

86 De Affectione Hypochondriaca.

instar parietibus matularum adhærescat; ægrisque calculi metum adferat. Adustam hanc materiam fabulosam, ad latera matulæ hypochondriaci cujusdam, in stellarum figuras hexagonas, non sine ordine conspersas, exactissime formatam vidimus. Nigra urina plerumque morbum seu paroxysmum solvit. In vitalibus hæc cernuntur.

Adest anxietas, cui sæpe accedit lypothymia, cordis palpitatio, velox & inordinatus cordis & arteriarum motus; pulsus varii, duri, nunc tardiores, nunc concitatiores, frequenter intermittentes excruciant ægros, ut jam de salute planè desperare soleant.

Pulsatio præterea in hypochondrio sinistro, præcipue post motum vehementiorem aut iram affligit.

Palatum, lingua & os exiccantur multum, & non levis continuò excitatur sitis.

Respiratio difficilis est, præcipue si insueto modo commoveantur. Dolor & constrictio in pectore sentitur, qui suffocationem minatur; multumque sollicitos reddit ægros.

In capite doloribus ita vexantur, ut
cere-

De Affectione Hypochondriaca. 87

cerebrum é cranio evelli conquerantur. Vertigine & mania inde sapissimè laborant. Si diuturni dolores sint cum vertigine associati, in Epilepsiàm & convulsiones, vel cæcitatem, interdum in utrumque, nonnunquam in apoplexiàm incidunt. Memoria aboletur, circa oculos caligo obversatur; aliis aurium fit sonitus, loquela deficit, & lingua quasi rigere sentitur. In nonnullis metus, tristitia, falsa imaginatio excruciat, ut se fascinosos, aliisve afflictos morbis facile credunt. In membris lassitudines spontaneæ, quietem affestare, & ad motum tardiores efficiunt. Dolores insignes & vellicantes in extremis digitis, tam manuum quam pedum, ac fornicationis sensus & stupor excitantur.

Vigiliæ molestæ & somnus perturbatus cum insomniis terrore plenis, præsertim post mediam noctem molestare solent: ad mediam noctem dormientes satis bene, postea vigilant. In quibusdam verò post tertiam vel quartam horam, iterum manè succedit somnus.

Post pastum facies rubore conspersa, multum

88 *De Affectione Hypochondriaca.*

multum accenditur nunc universim, interdum circa genas & nasum solum coruscavit rubor.

Symptomata hæc omnia non in omnibus reperire licet: sed alia in aliis, nunc pauciora, nunc plura apparent; & licet semper hæc laborantes affectione subinde aliquid mali de quo conquerantur, habeant; qui ea tamen graviter afficiuntur, vehementioribus interdum infestantur paroxysmis, cum symptomata, vel præcipua, increbuerunt.

Affectus difficilis est, & quo vix alius tanta symptomatum varietate & ægro & medico plus negotii faceffit. Ab alvi tamen laxitate moderata vomituque cum *inopœia* vel narium hæmorrhagia, hæmorrhoidum apertione, menses in mulieribus profluvio, aut varicibus sæpe expectatur remedium. Sin vero contumacissime opem recuset medicam, vel in scorbutum, aut hydropem degenerat; vel in febres, hecticæ non ablimiles incidentes, tabidi moriuntur.

Remedia quibus morbum hunc profligare conantur medici, sunt venarum apertio,

De Affectione Hypochondriaca. 89

apertio, natura vel arte, instituta; eamque per hæmorrhoides præcipue, maximam adferre utilitatem animadvertunt: an verò ab internis vel externis non multum interest: natura externas etiam commodè reseat, per easque sanguinem serosum, & falsum sponte evacuari, ab hypochondricis facile intelligamus, plurimumque prodest. A reliquis in brachio, vel alibi venis detrahere, ni simul adsit plethora, aut circa viscera *φλόσωσις* aliqua reperiatur, nulla cogit necessitas.

Medicamenta levia vel per vomitum aut sedem subducentia semper in usu sunt: fortiora omnia vitanda sunt, ne exasperantur humores, & malum inde crudelius affligat.

Amara omnia prosunt, dulcia & acida inimica; ideoque cichoreum, bsinthium, centaurium minus, geniana ex numero opem ferentium habentur.

Diuretica prodesse sperant, cum natura talem instituentem evacuationem, ut plurimum sanitas restituitur pristina. Hisce non cedenti remediis, efficacissimis

90 *De Affectione Hypochondriaca.*

mis istis chalybe, acidulis & thermis
occurrendum est.

Nocent omnes in dieta errores, si
potu præcipue vel cibus nimia varia-
te peccetur, aut copia ventriculus
obruatur; præsertim si flatulenta
qualia sunt fructus horarii, acida
musta, & non defæcata cervisia, ve
fortiores nimium liquores copiose in-
gerantur, vigiliæ nimia, exerciti-
immoderata, aut vita sedentaria, animi
nimia intentio, & lucubrationes præ-
sertim à cœna, animi pathemata gravio-
ra affectum hunc vel producere, vel
præsertim fovere & augere solent.

C A P. II.

De parte affecta.

Absoluta sic morbi historia in
partis affectu & causarum in-
quisitione laborandum est.

Antiqui medici affectam partem fu-
sse ventriculum (ut ex Hipocrate &
Diocle pateat) cogitarunt: & tali cha-
actere descripserunt. Hip. 2. de morbis
hic affectum hunc delineavit, non ine-
dium, non cibum sumptum ferre potest,
sed jejuna quidem rugitum viscera e-
lunt, ventriculi os movetur, & alias
aria vomit, bilem, salivam, pituitam,
& acutum ac post vomitionem aliquan-
tisper melius habere videtur, ubi autem
cibum sumpsit, ructus adsunt, cum ru-
ore incenditur, se semper copiosum
vi recrementum dejecturum putat,
um vero defecerit flatus infra demit-
tur; caput dolore vexatur, totum cor-
pus velut aciculis pungi videtur, crura
travantur, debilitantur & minuuntur,
debilisque evadit.

Dioclem

92 *De Affectione Hypochondriaca.*

Dioclem (referente Galeno) ventriculum affici cogitasse luculenter constat. Oritur, inquit, alius à ventriculo morbus qui ab aliis melancholicus, ab aliis flatuosus nominatur, quem sumpto cibo maxime coctu difficili sputum multum comitatur, item ructus acidissimi, flatus, ætus in hypochondriis, fluctuatio non illico, sed cum retinuerint: interdum ventriculi quoque vehementes dolores, qui nonnullis ad dorsum usque procedunt, concoctis inde cibis quiescunt, mox aliis cibis ingettis eadem revertuntur accidentia; quæ interdum à cœnâ molestant, atque evomunt crudos cibos, & phlegmata subamara, calida & acida, adeo ut dentes torpedine afficiantur. Galenus Lienem accusat, quasi per idiopathiam ipse, cæteræ vero partes per consensum à liene laborarent, totaque pene medicorum cohors, quasi in verba magistri jurassent, in lienis infamiam conspirasse videntur. Atque illum chyli partem terrestrem per ramum splenicum rapuisse, & melancholicum succum superando reponere statuunt, unde tumidus in ventriculum per vas breve succum illum

De Affectione Hypochondriaca. 93

lum acidum effundit; ac singulorum fit author symptomatum in hypochondrio sinistro enascentium.

Alii in Mesenterio obstructions accusant, quasi chylus in ventriculo detentus, ob defectum suctionis venarum, incrassetur, & terrestrior fiat: ut inde sanguis generetur sæculentus, totius mali author crudelis; unde vasa Mesenterii obstructa magis, suctio tandem omnino depravatur.

Alii cavitates quasdam extra ventriculum in omento & alibi effingunt; quibus sedem huic figunt imperialem: Neque mirum proinde habeatur, si in curatione tam difficilis morbi diu hæserunt medici, cum de ioco affecto tam male inter se convenire videntur.

D. *Hecstieternus* strenue satis lienem à reatu vindicare videtur; & ventriculum cum Diocle condemnat, cujus argumenta non contemnenda sane decad. 5^o. videatis. Lienem verò sanguificationis organum à ventriculo chyli partem tenuiorem suxisse, non succum acidum melancholicum in illum expuere iudicat.

Actio, inquit, læsa ventriculum non
lienem

94 *De Affectione Hypochondriaca.*

lienem laborantem indicat. A ventriculo vomitiones, nausea, flatus & murmura, non à liene ortum petunt, & vere quidem læsum ventriculum ostendunt. Cui & non impertinenter quidem addere possumus Actionem Splenis prius cognosci debuisse, quam læsam pronuntiamus. Designata enim illi officia Sanguificationis, aut succi melancholici separationis, competere nequeant. Neq; aliud adhuc enumeratur officium quod in affectione hac depravari declaremus. Si itaque officia & actiones lieni à medicis assignatæ, illius non sunt, ut alibi & infra fufius docebitur: & illæso liene ventriculum in hoc malo semper affectum fuisse; illum neque partem affectam, neque mali causam fuisse sequetur: sublata enim causa tollitur effectus.

Doloris symptomatumque maxime urgentium situs idem testabitur; quæ licet in sinistro audiuntur hypochondrio, ventriculum non excusant, licet eadem sede cum suis venis & arteriis lateat Lien; In ventriculi enim cavitate fluctuationes, murmura, & rugitus liberius commoveri poterint, quam in angustissimis lienis vasibus.

Labo-

De Affectione Hypochondriaca. 95

Laborantium præterea digitus dolo-
rem antrorsum magis circa ventriculi
undum, & coli intestini reflexionem,
ubi versus renem sinistrum reflectitur,
& lieni cedens adnætitur; ubi sistantur
tactus, & murmura audiuntur; vergere
solet Splen ad posticas magis locatur
arteres, ubi ut situ à dolente sejungatur
arte, sic neque à longioribus emplastris
tubuli splenis formam referentibus,
quasi illam obtinuerat figuram & situm;
quidquam alterari judicamus; cum ven-
triculo magis quam lieni applicari vi-
entur.

Deinde doloris vehementia situm in-
ter partes sensibiles ostendit, qualis est
ventriculus & colon; non in liene, qui
vel nullum, vel obtusum obtinuit sen-
sum: In liene itaque partem affectam
invenire haud liceat.

Mesenterii neque vasa obstructa af-
fectum hunc Hypochondriacum consi-
dere poterint, ideoque nec hic partem
inveniri affectam pronunciamus.

Vasa Mesenterii sunt vel arteriæ &
venæ, vel vasa lactea: arterias & venas
solum, per Mesenterii vasa, ignotis ad-
modum lacteis, intellexere scriptores.

Atque

96 *De Affectione Hypochondriaca.*

Atque hæc obstructæ sanguinem recte quidem distribuere nequeant; sed quomodo inde mali hujus authores esse censeantur, nondum constat. Distributio impedita sanguinis, succi scilicet alimentarii, tabem forsitan in partibus quibus proferre debuerunt obstructa vasa, conciliare poterit; tanta inde symptomatum series luxuriare nequeat. Vomitus, acidus, fluctuatio, murmura, rugitus syncope, delirium sine febre, &c. à vase obstructo nequaquam petunt originem. Si hinc suctionem impediti dicant chyli à ventriculo; unde incrasari & incalescere, sanguinemque talem lentum ac melancholicum confici, atque inde omnium symptomatum authorem fuisse existimarunt: dicimus vasa hæc non in ventriculum sed intestina implantari: Neque (uti somniarunt) chylum eliciunt ab intestinis, sed arteriæ hisce succum attulerunt alimentarè, & venæ superfluum à nutritione reducunt, & in Portam refundunt. Vasa lacte chylum separant; atque sic vasa illa mesenterica à reatu tali excusantur.

Si in lacteis obstructions accusant non meliori successu locum inveniunt affectuum

De Affectione Hypochondriaca. 97

ffectum: quia denegata chyli transmis-
io, talem forsan totius, non tantam
ymptomatum complicationem conci-
liaret.

Neque magis consistæ cavitates extra
ventriculum in omento, aut vasibus cir-
ca lienem, hepar aut stomachum, histo-
riæ hypotheses solvunt; cum vitia ista
quæ extra vasa consistent, ut in eâ facile
effundi, & proinde in corpus hinc inde
effundi non possint; tot symptomatum,
quot in affectione hypochondriaca ani-
advertuntur, causæ esse non possunt:
imo plerumque non nisi in mortuis
agnoscuntur, cum in partibus ignobili-
bus consistent; & observationes Medico-
rum docent, plurimos qui talia Mesen-
terii, omenti, pancreatis &c. mala passi
sunt, de affectione hypochondriacâ con-
iectos non esse: vomitiones acidæ, &
stus à materia, hinc in ventriculum
fusa, causari nequeant? quia ductus
illi reperiuntur in dissectione, quibus
a communicetur materia. Locus ita-
e in quo affectus hypochondriaci cau-
contineatur, talis est constituendus,
quo humores hinc inde fluere possint.
eoque nec in hisce cavitatibus ima-

F

ginariis,

98 *De Affectione Hypochondriaca.*
ginariis, morbi hujus crudele hospitium
est inquirendum.

Quam itaque partem, sedem morbi
aliam præter ventriculum constituam?
Hippocrates & Diocles ventriculi mor-
bum denominant. Symptomata omnia
à ventriculo male affecto, illæsis cæte-
ris, oriri poterint. Præterea assignati
jam loci nequaquam historiæ hypothe-
ses solvunt, cum ex supposititio falsoque
principio stabiliantur, ex ignorantia sci-
licet officii lienis, ut supra ostensum est.

Quid aliud itaque agendum est,
quam ut infamiam, qua lienem & Me-
senterium immerito calumniati sunt
Medici, in ventriculum debilem, rela-
xatum, & in officiis oberrantem figa-
mus? quomodo vero ibi generatur cau-
sa Mali, infra docebitur.

C A P

C A P. II.

De Affectionis Hypochondriacæ
Causis.

CAusam hujus affectionis im-
mediatam, esse Melancholi-
am, à liene in ventriculum
immissam, unanimo consensu suffraga-
runt omnes pæne Medici: per melan-
choliā, humorem salsa, acida & amara
qualitate impregnatū, qui vomitu ejici-
tur, intelligunt. An vero talis naturaliter
in homine sano generetur, statim erit
inquirendum.

Diocles licet morbi sedem in ven-
triculo posuit, causam fore venarum
mesaraicarum obstructionem & calo-
rem seu inflammationem pylori voluit,
sunt & hodie plurimi, qui nihil nisi
obstructiones in singulis pæne morbis
accusant.

Alii intemperiem partium natura-
lium, hepatis, lienis, & ventriculi dam-
nant,

100 *De Affectione Hypochondriaca.*

nant. Humores illos crassos, viscidos, instar glutinis qui vomitu rejiciuntur à frigiditate ventriculi generari fatentur; sed a vitioso sanguine à liene nutritus, rectè suum officium exequi nequit, ideoque tales humores & generat & accumulatur ventriculus. Alii vero ventriculum caloris & siccitatis arguunt, quasi suo calore chylum in crassando, obstructionum & flatuum inde causa foret. Qui ventriculi frigiditatem accusant, in hepate & liene præsertim, vasibusque, quæ ab illis ad ventriculum tendunt, intemperiem siccam & calidam esse contendunt. Atque ita ἀνωγειὰν quandam inter ventriculum frigidum & viscera calida fuisse statuunt; quam non solum difficilem reddere curam, sed & pugnantium singulorum symptomatum authorem esse cogitarunt.

Causam vero præcipuam, à qua causa proxima, humores scilicet vitiosi, generantur, esse lienem statuunt singuli; licet hepar quandoque non extra culpam sit, ventriculum vero etsi ad malum hujus generationem facere possit; non tamen causam proximam esse, sed remotam; quatenus chylum pravum sup-
peditat,

De Affectione Hypochondriaca. 101

peditat, quo viscera naturalia obstructa
intemperie calida & sicca laborent.

Si vero Morbi symptomata, & pars
affecta recte perpendantur, causam hu-
jus mali proximam esse ventriculum,
debilem, relaxatum & male coquen-
tem; non lienem alimentum ventricu-
lo suggerentem vitiosum, facile erit o-
stendere, 1^o. Quia lien non sanguificat,
nec ventriculi est promptuarium, uti
alibi ostensum est. 2^o. si tale fuisset a-
deptus officium, ventriculo, cæterisque
partibus accusatis alimentum suppedi-
tare nequeat, quia vasa omnia quæ cum
ventriculo communionem habere vi-
dentur, venæ scilicet, præsertim decan-
tatum illud *vas breve*, non à liene ad
ventriculum tendunt, sed è contra à
ventriculo versus lienem spectant; uti
Valvularum situs, sanguinis à ventricu-
lo refluxum versus lienem facile admit-
tens, non è contra, manifeste docebit.
A vitioso itaque nutrimento à liene
communicato ventriculi officia non de-
turbantur: Nec eo nomine mali hujus
causa judicari debuit Lien.

Affectionis hujus neque causam ha-
bere lienem posse judicamus, si revera

illud alterum quod effingitur officium sit adeptus: nempe si ad usum stomachi, succum melancholicum à sanguine separaret. Quia si talis in sano corpore naturaliter inveniatur humor: quærere tamen licet ad quem finem talis in ventriculum effunderetur succus; nihil temere evenisse putandum est. Vel in ventriculum tanquam excrementum effunditur, vel ut aliquod illi communicetur bonum, vel ad propriam nutritionem, aut ad usum publicum, ad concoctionem facilitandam utile. Non ut excrementum in ventriculum deponitur: per venas fieri nequit, cum ut dictum est, valvulæ omnem à liene transmissionem denegant, neque vas aliud excretorium illi peculiare conceditur, quo in ventriculum, aut in aliam aliquam partem hoc deponat excrementum; ergo non separat melancholicum succum sub excrementi notione. Neque 20. ut aliquod ventriculo præstet officium; Illo non nutritur, omniaque sine illo recte sua peragit officia. Ingestos comminuit cibos, benè coquit, neque deficit appetitus. Imo è contra si casu talis in ventriculo succus hospitatur acidus,

De Affectione Hypochondriaca. 103

acidus, appetitus statim deicitur, digestio depravatur, ructus nauseant acidi, fermentatio perpetua flatus ac vapores excitat, uti infra monstrabitur. Non itaque ad usum publicum in ventriculum à liene transmittitur succus iste.

Quod ad viscerum obstructions attinet, neque hasce affectionis hypochondriacæ causas fuisse primarias judicamus. Obstructions vel in vasibus, vel in parenchymatum poris fiunt, unde humores libere percurrere nequeant; hinc si succi alimentaris impediatur distributio, contabescunt partes: si humor excrementitius in parte aliqua retineatur, intumescit, & inflammatio forsitan & abscessus, aut, si frigidi fuerint humores, scirrhus sequetur, vomitiones acidæ, eructationes, murmura, mœstitiæ, vanæ imaginationes, convulsiones, respiratio difficilis &c. raro aut nunquam inflammationis in hepate aut liene, multo minus non distributi alimenti sunt affectus.

Qui à partium naturalium intemperie hujus mali originem quæsierunt; parti ali duntaxat contenti, immediatam illius non invenerunt causam; omnis

104 De Affectione Hypochondriaca.

enim hepatis, lienis, aut ventriculi intemperies affectionem hypochondriacam non semper progeniit; Imo sæpè mali hujus originem insequitur. A viscosa, acida, ac lenta pituita obstruitur hepar, aut lien, aut pancreas; obstructionem sequitur intemperies; atque hinc forsan malum augeri posse, non illi debuisse originem arbitramur; Uti infra monstrabitur. Ventriculi intemperies humida fibras ejus relaxare poterit, ut contentos cibos ritè egerere nequeat; unde acorem contrahunt: sed hæc causa est remotior, non immediatus mali progenitor. Ventriculum mali causam præcipuam esse diximus. In ventriculo autem fibrarum nimiam relaxationem & debilitatem præcipue peccare, malique causam proximam constituere existimamus. Unde ingesti cibi nec comprehendendi, nec debito calore foveri, comminui, & in intestina propelli poterint: sed partes tenuiores & spirituosæ, à debili fibrarum compressione in intestina protrusæ, à visceribus avidissime per vasa rapiuntur lactea: neglectis aut saltem non separatis crassis, mitioribus & fibrosis particulis, nondum à ventriculo concoctis

De Affectione Hypochondriaca. 105

concoctis & dissolutis. Atque inde sanguis tenuior, flatulentus, ac nimium spirituosus fermentationi perpetuæ obnoxius, ob fibrarum partiumque initium inopiam, assimilationi ineptus generatur.

Crassiores vero reliquæ ciborum partes ob moram in ventriculo longiorem, (dum debilis fibrarum ad expressionem non sufficiat compressio) in materiam lentam acidam & viscidam, ventriculi tunicis, sibi que adhærentem degenerant, quæ à calore (non satis tamen ad digestionem activæ) rarefacta, in flatum, ventriculum & intestina, præsertim Colon, & inde hypochondria distendentes abeunt. Quod in intestina viscosæ hujus ciborum partis protruditur, illorum tunicas obliniit, ut irritationis biliosæ non sensibilis, facultas sopiatur expulsiva, & excrementa non deiciat. Neque sane per intestina ob lentorem sine stimulo facile dilabi poterint, unde alvi pigrities, & excretorum viscida limositas exoritur.

Si per lactea hujus quidpiam cum chylo tenuiore arripiatur; cum in secunda concoctione corrigi nequeat, in visceribus

106 *De Affectione Hypochondriacâ.*

ceribus obstructionum author est. In hepate vasa obstruit *cholidocha*, unde bilis à sanguine non separatus, aciditate hujus materiæ irritatus, fermentationem atque inde fervorem & tumultum in tota sanguinis massa excitat, unde tenuis admodum, flatulentus, multumque fermentatione commotus sanguis, fulguris instar, singulas percurrit partes, easque conturbat, fervorisque participes efficit. In pulmonibus bronchiæ spongiosumque parenchyma lento viscidoque hoc infarctæ succo, difficilem reddunt respirationem. In extremis vasa capillaria illo obstructa, diaphoresin impediunt, & inde febres excitantur, lassitudines spontaneæ, & extremarum partium dolores.

Causæ remotiores sunt quæcunque fibras ventriculi flaccidas & debiles reddere soleant; Eaque vel ab erroribus in dieta petuntur, cum cibi flatulenti ventriculi tunicas perpetuo ultra naturalem extensionem distendant, ut se rursus debito modo contrahere nequeant; sed Debiles & flaccidæ à spiritibus, vix aut ægre tenduntur fibræ; unde ventriculus vel semper fit flatibus ten-
sus;

De Affectione Hypochondriaca. 107

sus (quod ut plurimum hypochondriacis contringere solet) vel emissis flatibus, latus propendet & sese constringere non potest.

Vel cum cibis nimium liquidis fibræ continuo imbuantur; vigorem tunc etiam & contrahendi potentiam amittunt; unde facile à flatibus distendi, ægre autem constringi poterint. Spiritus licet spongiosas illarum cavitates repleant & infarciant, contractiores tamen non efficiunt tunicarum fibras, quia liquidis tantummodo imbutæ, adeo relaxantur, ut ad latus facile tensioni spirituum cedentes, ista tensione non abbrevientur, & contrahantur. Partes inferiores à superiorum motu non ducuntur, quia naturalis particularum connexus in relaxatione infirmatur; quod fit vel nexum & continuationem quasi infringendo, vel quia materia aliena & peregrinâ replentur pori, in quos particulæ commotæ recedere soleant: tunc motæ & distentæ priores, non insequuntur posteriores, quia spatium in quod moveri debeant, alieno, scilicet humiditate adventitia præ occupatur? Hinc potatores & bibaces malo hoc hypochondriaco

208 *De Affectione Hypochondriacâ,*

Hypochondriaco sapissime laborant, quorum ventriculi, bibendi frequentia, corio similes in aquâ diu madefacto, fiunt laxi ac flaccidi ut cibos amplecti & constringere nequeant.

Naturalis etiam fibrarum laxitas & debilitas in ventriculo, ad hunc effectum generandum & accelerandum conducere potest. Hypochondriacorum liberis, etiam hæreditario jure malum hoc communicari cernimus.

Deinde laxas reddunt fibras ventriculi quæcunque spiritus, vel dissipant animales, ut nimia venus, magna sanguinis effusio, ægrotudines longiores, frequentior hypercatharsis: A ut quæ ad alias sollicitant partes, ut animi affectus, præcipue ira, curæ, mœstitia, exercitatio statim à passu, vigiliæ & lucubrationes. Tunc fibræ minus quàm par est tensæ, cibos ingestos ægre amplectuntur, & in intestina debito non excludunt modo: sed in ventriculi fundo, quasi in sacculo, residentes, in succum acidum, viscosum & putridum commutantur; unde flatūs gignuntur, dolores tensivos excitantes in hypochondriis & intestinis, præcipue colo, cujus cellulae idoneum
flatibus

De Affectione Hypochondriaca. 109

flatibus præbent hospitium.

Spiritus dissipant etiam, ventriculū maxime debilitant, fermentationem accelerant & augent, liquores calidiores, vina sæpius hausta; aquæ item spirituosæ, ut vini, cervisiæ, aut alterius cujuscunque spiritus: hinc etiam potatores malo huic sunt obnoxii.

Evacuationes suppressæ hæmorrhoidum, vel mensium malum hoc generare poterint, spiritus circa ventriculū suffocando, aut calorem in visceribus augendo, qui ventriculi calorem, & spiritus dissipat; aut à viscoso chylo flatus copiose nimium excitat.

Neque hæc fibrarum laxitas in ventriculo solum cernitur, sed & intestina ejusdem debilitatis conscia, ad excludendas fæces non insurgunt, atque ideo pigra semper alvus fit hypochondriacorum; flatibus etiam tensæ, non se stringunt fibræ, ut promoveantur, & expellantur, sed distentæ & inflatæ diu manent; nunc universam per totum intestinorum ductum, & ut vesica fuilla à pueris inflata sæpe inveniuntur & abdomen totum attollunt, nunc in particulis & gyris quibusdam stabulantur
flatus,

110 *De Affectione Hypochondriaca.*

flatus, ibique ultra modum disientæ, tumores quosdam in abdomine, quos glandularum esse æstimarunt medici, excitant. Qui nunc statim evanescunt, nunc diu satis permanentes, nonnunquam semper percipiuntur cum fibrarum laxitas continuata in illis gyris & convolutionibus intestinorum, perpetuum flatibus concedat habitaculum & tumorem effingunt.

Restat jam ut causas hasce assignatas per morbi historiam examinemus, an hypotheses, scilicet, omnesque solvant objectiones; si non, ex sufficientium causarum numero, ut spurix & fictæ, sunt rejiciendæ. Sed ut examen felicius procedat, de lienis usu & officio quædam, de humore etiam melancholico quædam esse perquirenda, necesse est.

CAP. IV.

De Lienis usu & officio:

Descriptionem lienis anatomicam habetis in disquisitione nostra *anatomica* talem. Figuram adipiscitur sedi suæ proportionatam, oblongiorem paulo & quasi ovalem, eaque parte quâ tumentem admittit ventriculum, cavus quodammodo occurrit, ab extra gibbus: longitudine sex, latitudine tres digitos æquat, crassitiem duarum habet. Substantia ejus ex sanguine inter fibras, quas habet innumeras concreto constat. In ventriculi latus sinistrum, paulò posterius versus renem spatium inter illum & coli reflectionem occupans, incumbit. Vasa habet, 1^o. Arteriam ex cæliacâ insignem, per ejus substantiam variè dispersam, in plurimas ramorum soboles inter fibrosas complicationes diffusam, Venam etiam quæ portæ propago esse videtur, & arteriam associat.

In

112 *De Affectione Hypochondriaca.*

In animalibus quamplurimis ad lienis portas solum pervenit, & in spongiosam lienis substantiam terminatur; quasi nihil aliud agere à natura destinata foret, quam ut sanguinem à poroso lienis parenchymate ad portas reciperet. Præter hæc propaginem nervosam à sexto nervorum pari obtinuit ac innumera fibrarum filamenta, tenuia, valida, variè inter se complicata, quasi retia multa simul implicarentur, utrinque interiori faciei adnata, ex quibus principium ducere videntur & totam pæne lienis constituunt molem, circa hæc carnosa quædam substantia leviter undique circumvoluta adhærens lienis parenchyma constituit porosum, & quasi spongiosum; foraminula interjecta, inania sicut in pumice, quædam majora, quædam parva habet. In quibus arteriæ (cum nervi ramusculis) dispersæ sanguinem copiosè effundentes, totam lienis irrigarunt substantiam, & inania illa & spongiosa foraminula sanguine fervidiore repleverunt, qui à venâ rursus lacunatur, & in portam effusus hepati mandatur. Præter hæc

De Affectione Hypochondriaca. 113

hæc nulla alia vasa aut ductus novit Anatomia.

Ex hac lienis descriptione facile erit virtutem illam sanguificam (hujus ætatis idolum insigne) inter fista splenis officia ordinare; cum vasa nulla chyliifera quibus à ventriculo, aut intestinis illi communicetur chylus inveniuntur dissectio Anatomica. Si per vas illud breve venosum transferri obiciat *Hecstetterus*, quia sedationem famis indicatissimam fieri voluit *Piso*: & distributionem liquidorum, clauso adhuc pyloro, esse credibilem ipse putavit; cum vix hausto potu è mensa, qui eum copiosius hauserunt, surgant ac aquosam reddunt urinam. Vel quia in vivorum dissectionibus, si vasculum illud breve ligetur, versus lienem detumescere statim & vacuum esse invenias; versus ventriculum verò turgere maxime sanguine tensum. Non tamen succo chyloso hac via irrigatur lien: Quia hoc cæteraque vasa venosa à ventriculo diducta, inter ipsius tunicas dispensantur, nulla cavitatem penetrant, quibus chylum eliciant; sed è minoribus surculis in truncos majores colliguntur & acce-

114 *De Affectione Hypochondriaca.*

acceptum ab arteriis sanguinem non
chylum in ramum splenicum, (mirum
itaque non est si à ligatura versus ven-
triculum turgat) atque inde in por-
tam transmittant, hepatis reducendum;
nec quidquam illius portas lienis in-
travit. Neque potius mediante liene
itinere breviori ad renes commigrare
poterit quia nullum inter renes & lie-
nem commercium admittit dissectio:
illud quod per arterias fieri existima-
runt, impossibile esse docebit circula-
tionis sanguinis doctrina.

Per vas breve itaque chylus lieni non
cōmunicatur, neque magis lacteæ venæ
huic officio ministrant, cum nullæ lieni
concedantur. Neque revera illarū opus
est, cum officium illud sanguificationis
lieni affixum, non minus vanum & otio-
sum, quam impossibile sit. Viscera enim
inferioris ventris ab illo irrigari (uti
asserunt nonnulli) nequeant, cum
nulla illis vasa à liene distributa repe-
riantur; quibus lienaris hic dispensetur
sanguis. Viscera cuncta suas habent
arterias, quibus alimentum à corde,
non liene suppeditetur, & quod à lie-
ne per ramum splenicum transcurrit, in
portam

De Affectione Hypochondriaca. II 5

portam deponitur, & ab hepate obsor-
betur uti ex circulationis doctrinâ faci-
le patebit. Neque minus impossibile
est istud cordi supplementum per ar-
terias à liene, quibus spirituosior &
perfectior illi ad spirituum generatio-
nem deducatur sanguis: alterum lie-
nis officium. Cuivis enim cui nota est
sanguinis circulatio ridiculum satis vi-
debitur; ut per eadem vasa sanguis
impetuose in lienem à corde propelle-
retur, & simul per eadem etiam retro-
cedat & sanguinem spirituosum cordi
elargiretur lien: sed de hisce plura in
Disq. Anat. videatis.

Neque idoneum pro succo melan-
cholico receptaculum haberi poterit:
licet in Disq. Anatomica sententiam
hanc studiosè defendere conati sumus;
nummodo nullum aliud excogitare
potuimus officium. Sed cum difficul-
tatibus urgeri plurimis observavimus;
neque munus illud aptè lieni conveni-
re posse invenimus, non pigebit ab er-
oribus recedere & mutare sententiam.

Melancholiæ hospitium conveniens
non datur in liene:

1°. Quia in omni excrementi sepa-
ratione,

ratione, natura receptaculum ac ductum ordinavit, quibus quod vitiosum est, & separari debuit, excerni poterit: ut in hepate vasa *cholidocha* & *vesicula biliaris*, bilem à sanguine separant, & in intestina excludunt. In renibus ad separationem inserviunt *Pelvis*, seu cavitatis illa in medio renum sita, *arteres* & *vesica*. In cerebro ventriculi sua exonerant excrementa. In liene verò neque cavitatis pro receptaculo neque ductus aut vasa, quibus immediatè excrementum deponi poterit in dissectione reperiantur. Arteriam solam insignem unica consociatam venarum nervi ramusculo obtinuit. Ductus illi ab Hippocrate assignati ad officium hoc exequendum, modo naturæ ordinario, nequaquam ad diurnam excrementi depositionem sufficere arbitramur, quia immediatè liene non contingunt, & quod per illos in artificialibus excretionibus deponitur, non minus totum venosum genus lacunant, quam liene. Menstrua nonnunquam vomitu rejiciuntur, aliquando ad nares ascendunt; non itaque excretorum uteri receptaculum haberi debuit vel

ven-

De Affectione Hypochondriaca. 117

ventriculus aut nasus.

2°. Si in liene generetur succus hic acidus sive melancholicus, & in ventriculum effundatur ad appetitum accendendum, & concoctionem facilitandam; In liene effectus aciditatis sive fermentationis eminenter illustrarentur; in ventriculo remissius agerent. In fonte & loco generationis qualitates activitatem magis exerunt; cum verò paulisper à foco removeantur, frigescit & debilitatur. In liene verò non solum deest activitas aciditatis, sed qualitas illa omnimodò desideratur; alius nunquam si comedatur reperitur: sanguis in illo ejusdem est saporis ac dulcedinis, cum eo qui in alijs corporis partibus invenitur. Stomachi vituli tunica recens adhuc, vel immo exiccata, à mulierculis ad lac coagulandum reservatur; illudque conflatum fermentat, exagitat, caseosam colligit partem, & à sero separat. Atque hoc agit per succum acidum fermentalem illi adhærentem & infixum, quem per menses aliquot, licet aquâ copius fuerit lota & macerata integrum servat & liquorem quemcunque eandem

118 *De Affectione Hypochondriaca*

dem tingit facultate, & non solum in vituli stomacho facultas hæc coagulandi conspicitur, sed in singulis animalibus viget eadem & semper; licet in tenellis & lactantibus magis citiusque operatur. Lien verò effectum talem nunquam producet; lac nequaquam illo condensabitur, nec fermentatio major, quam à cæteris visceribus in lacte reconditis excitabitur. Qui hujus re periculum faciet, lienem succi hujus acidi seu melancholici hospitium esse non facile admittet, & proinde sedens ac reatum effectus hypochondriaci diruet, & vel talem non generari humorem, vel in liene non separari, ac in ventriculum effundi aut inspirari fatebitur.

Præterea in hujusmodi affectibus obnoxiiis & post obitum exenteratis lienem ab omni tali culpa absolverunt medici.

Officium aliud Lienis à Doctore Glissonio in Anatomia Hepatis ingeniosè satis prolatum invenio; ubi in Liene vehiculum succi alibilis per fibras nervosas à sanguine separari, & in nervo sibi conjunctos transferri opinatur; hinc

nervorum plexum glandulis renali-
bus adsitum traduci; ubi nervorum
confluxus eidem excipiendo par, in
romptu est; & cum succo alibili a
glandulis mesentericis & lumbaribus
romanante mistum, tempore somni
ræcipuè intrò ad cerebrum & spina-
lem medullam simul cum eo confluere;
quo potissimum tempore liquore illo
utriuntur. Excusso verò somno, cere-
brum & spinalis medulla sese contra-
unt ac tensiora evadunt; hinc motus
succi alibilis in nervis fit refluxus, fer-
rique pederentim liquor ille partim
ad solidas partes nutriendas, partim ad
glandes emunctrices.

Quod ad usum hunc lienis ac nervo-
rum attinet; dubia saltem proponam
nonnulla, quæ ut consensum huic opi-
oni retardant nostrum, sic & validi-
tatem officii impugnare & infringere
videntur.

Quæritur primò, quomodo vehicu-
lum succi alibilis a sanguine separetur
in animalibus, quibus nulli reperiuntur
lienes, uti avibus, aut quibus eximantur;
an in illis succus alibilis nervos sine ve-
hiculo pertranseat? vel aliud ejus loco
sub-

120 *De Affectione Hypochondriaca*
substituitur viscus ?

2^o. Quomodo constat in liene aliquid ad nutritionem utile separari ? cum ut dictum est nullum peculiare vas separatorium habeat ; an quia nervorum insignem obtinuit propaginem ? Sic & cor, muscoli & membranæ, quarum autem sit in illarum partium recessibus succi cujuscvis secretio nondum constat.

3^o. Cur diversæ partes pro succi alibilis, & vehiculi ejus præparatione constituentur ? Cum in chyli generatione ambo simul præparantur in ventriculo.

4^o. Annon viscus nobilioris officio ignobiliore damnatur, cum lien multo glandulas (sua conformatione) antecellat ?

5^o. An naturæ legibus sit consonum in iisdem vasibus humores fluere & refluxere posse ?

In asperâ arteria movetur aer, qui pulmonum vim, dilatationem & compressionem facile sequatur, non liquor, qui majorem requirit impulsu. In contrariis affectibus, scilicet gaudio, mœstitia, &c. non est humorum aut spirituum

De Affectione Hypochondriaca. 121

spirituum motus reciprocus in eodem canale. In timore sanguis in cordis halamos impetuosè irrui, per venas scilicet, non per easdem in gaudio aut æritia effunditur; sed per arterias effusus, ruborem in genis conciliat. Neque in scrophularum aut glandium prioridiis, materiâ ab iisdem valibus, quibus suppeditatur, resorberi constat; per arterias enim accedit, per venas recedit.

6. Quomodo motus hic reciprocus in nervis perfici poterit? Cum liquida seipsa movere nequeant, nec in nervis virtus invenitur pulsifica, qua à loco ad locum prorsum scilicet & retrorsum promoveantur.

Quinque modis in vasibus humores moveri vult Dr. *Glissonius*: 1^o. Quo tenore ad eandem metam propelluntur; 2^{us}. est mixtus quietis intermissione interruptus; 3^{us}. est motus reciprocus in iisdem vasibus prorsum retrorsum: hoc pacto aer in aspera aëria cietur; 4. est motus electivæ tractione concitatus, quo diversæ sanguinis particulæ ad partes, non organica aliqua attractione, sed à similitudine familiaritate, atq; affinitate cor-

122 *De Affectione Hypochondriaca.*

poris attrahentis cū attracto promoveantur; quinto, liquores in valbus moventur irritatione, quæ fit vel plenitudine, acrimonia, vel vigoratione nervorū

Primus movendi modus succo huic in nervis non competit, sed sanguini in arteriis & venis; vis eadem pellere ad partem, ac ab eadem repellere nequeat. Secundum huic convenire posse; scilicet succi hujus in nervis quiete interruptum ait. Reciproce etiam cedit ac recedit quoad tertium movendi modum. Sed quis motus hujus auctor est? In se motus principium non habent humores, sed vel impulsu ab extra aguntur; vel rarefactione, cum crassiores calore attenuantur partes, sese expandunt liquida, & locum petunt ampliorem: atque talem fuisse sanguinis motum primum in ovo, cū i rimū in punctū saliens irruat in primis incubationis diebus. Quod ad electivam attractionem attinet, quo modo per illam ad partes distantiores commoveri poterit chylus, nondum constat. Similia similibus gaudere fatemur, cum associantur mutuoque gaudeant amplexu, sed quomodo accessus fiat non ostenditur;

De Affectione Hypochondriaca. 123

ditur; præcipuè cum contactum negat distantia. Diversæ partes diversas alliciunt pro nutritione particulas, sed quas arteriæ cum reliquo sanguine illas effundunt; bilem attrahit vesicula felleis, sed quem vasa cholidocha ubi vis sparsa, ab hepatis parenchymate separatim exceperunt. Sanguis non tunc allicitur quia biliosus; sed quia cordis impulsu per arterias impellitur, cum vero in hepatis parenchyma effusus sit, contactu, non operatione aliâ electiva ad distans influente separatur, à cholidochorum ramusculis absorbetur. Præterea quod electiva attractione moveatur, ad unicum, non ad diversos dirigitur terminos; aut si ab utroque alliciat, anceps vel in medio hæret, à vel à fortiori attrahitur; errum inter binos magnetes ad neutrum movere dicitur. Qui sit itaque succus iste qui affinitatis & similitudinis gratia ad cerebrum attrahitur, eadem familiaritatis lege rursus ad pedis pollicem retrahatur? cur in motu impeditur, non anceps cui adhæreat, in medio esitat?

70. Si succus hic alibilis excussio den-

124 *De Affectione Hypochondriaca.*

taxat somno experrectis solum ad partes extremas nutriendas recedat; quomodo infantium partes aut animalium illorum quæ per menses aliquot somno sepeliantur, nutriuntur? an cerebrum solum, alitur & augetur cæteræq; marcescunt partes? Rachitide laborarent omnes infantiuli.

8. Cur nervi lienis præ cæteris sex-
ti paris ramusculis hoc peculiare officium obtinuerunt, nulla est in structura, cavitate, aut divisionis modo, differentia, qua peculiare hoc privilegium illis ascribatur. Quodlibet organum cui actio ususve publicus ab aliis partibus diversus obvenit, structura quoque peculiari gaudet, qua actioni illi ob-
undo reddatur accommodum (uti ipse testatur) In his nulla structuræ a cæteris invenitur diversitas. Numerus aut magnitudo, nec diversitatem structuræ, neque aliud a cæteris ejusdem furculi ramusculis arguunt officium.

Usus autem harum fibrarum nervosarum dicimus esse laxum spongiosumque lienis parenchyma stabilire, ne a sanguinis ex arteriis affluentis impetu ruptum dissiliat, cui aliud non minus

ne-

De Affectione Hypochondriaca. 125

necessarium fibrarum huic complicationi officium assignare possumus; scil. spongiosum constringere parenchyma, ut sanguis per laxas frequentesque cavitates diffusus, in venam splenicam comprimatur, atque sic arteriarum pulsui ancillari videntur: per arterias sanguis solum in spongiosas lienis cavitates effunditur, quæ ob laxam ejus consistentiam impulsui cedentem, expelli nequeat; fibrarum ope verò constrictis cavitatibus, in venam cogitur, qui pulsu arteriæ in spatio tam amplo moveri non poterit. Sanguinis illa copia (si parenchymate sine fibris constaret lien) solo arteriæ impulsu cum extra canales suos effundatur, lentè admodum in venam progrediretur: nisi fibræ hæ se constringentes, effusum citatius comprimerent sanguinem. Atque hinc major lien dispensatur nervus; quia motus hic fortior in fibris requiritur, majorque fibrarum numerus, ut constrictio generalior per singulas fiat partes. Officium hoc etiam lien a Doctore assignatum in vitium verti posse videris. Neque usum aliquem qui quærentium animis satisfaciat adhuc inveniri constat.

226 De Affectione Hypochondriaca.

Atque jam minus Erasistrati aliorumque infomnia mirari incipiam, qui membrum otiosum vocant, & nullius usus, cum assignata officia, rationis & dissectionis examen ferre non posse viderunt. Dolendum potius humanum ingenium tanta obscuritate esse obvelatum, ut illorum etiam quæ in nobis sunt ignari, quasi tenebris semper excutientes pervagemur.

Repudiatis hisce lienis officiis, quid aliud substituere licebit, quod structuræ ejus & situs rationi congruere poterit?

Lienem itaque ventriculi gratia esse formatum dicimus, ut calore suo, quasi foco supposito, concoctionem promoveat; ut motu inter particulas ciborum inde abortu, facilius per fermentum stomachale partemque liquidam seu potulentam fiat salium solutio.

Concoctio in ventriculo fit (fermenti naturalis subsidio) a calore blando moderata, & incluso cum sufficiente humiditate cibos comminante, macerante, & dissolvente. Non illo tantum qui substantiæ ventriculi innatus est (partibus enim membraneis minor

De Affectione Hypochondriaca, 127

& debilior conceditur calor, quam carnosus) aut a corde indefinente fluxu illi per arterias suppeditatur immediate; sed & illo præsertim quem circumstantes partes suo fotu suggerunt. Cujusmodi sunt in dextrâ & superiore parte Jecur, plurimis vasorum alveis sanguine copioso & ferventi turgentibus, calorem multum ventriculo communicans. In parte posica cavæ & aortæ trunci grandiores. In parte sinistra & circa fundum ventriculi, uti major ingestorum moles reperitur, atque inde vegetior illic requiratur calor, quo concoctio perficiatur, adstat lien; qui calore suo quasi foco supposito cibos perpetuo suo calore comminuit, macerat, ac particularum naturalem solvit compagem, eodem planè modo quo cibos in paropside duplici supposito igne, præparare & macerare soleant coqui, quo partes in cibis teneriores, magisque permeabiles redduntur, & particulae quodammodo commoventur ac turbantur; unde facilius fermento stomachali potulenta ingestorum pars infecta, in intimiores ciborum penetret recessus, motumque

128 *De Affectione Hypochondriaca.*

à calore inchoatum incitet, & augeat; sales dissolvendo omnes. Hinc statim ebullitio & fermentatio excitatur major, & particulæ amicam suam deferendo unionem, solutis vinculis diffuunt, totaque ruit compages, & in cremorem pultaceum (non diaphanum, nec essentialiter transmutatum, ut opinatur Van-Helmont, sed suis adhuc confusum excrementis) pro singulis totius particulis idoneum alimentum (cum à lacteis separaretur tinctura) dissolvitur. Atque sic tum perfectam fieri concoctionem in ventriculo judicamus, cum partes ita dissolvantur, ut per partem ciborum liquidam, tinctura, & quasi extractum singulorum eliciatur, ex quo sanguis postea commodè generetur. Atque talem ad perfectam chylicationem sufficere particularum separationem, sine formali aliqua transmutatione statuimus. Illam enim solum particularum separationem requirunt partes nutriendæ: si quæ formalis sit transmutatio, hanc efficiunt partes ipsæ in suarum alimenti electione & assimilatione. Præterea in digestionem cibos ingessos suas perpetuo con-

De Affectione Hypochondriaca. 129

conservare facultates inalteratas videmus. Cibi frigidi à ventriculi fermento aliam non adepti qualitatem, totum refrigerant corpus. Ingesta laxativa non restringunt, sed sine transmutatione aliqua in ventriculo semper purgant. Si itaque virtutes & facultates essentielles integræ reservantur in digestionem, non fit formalis aliqua transmutatio. Ad particularum separationem calor inclusus insufficienti humidi seu liquoris quantitate diffusus, sine alterius forsan additione sufficeret; sed longiori spatio, aut igne violentiore opus esset; ut in chymicis extractionibus videre liceat. Sed ut sælicius & citius hoc exequatur munus digestivum, hoc fermenti naturalis subsidium adiungitur, quo particulæ magis agitantur, ut dehiscant in minima, & pars ciborum liquida incalescens ad sales dissolvendos citius admittatur: facultas verò hæc fermentalis in ventriculo, non liene residet, uti infra demonstrabitur.

Caloris administrationi hoc modo quam optime paratum esse lienem stru-

ctura docebit. Insignem enim adeptus

arteriæ

130 De Affectione Hypochondriacâ.

arteriæ truncum majorem multo cum
hepar, in substantiam ejus spongiosam,
copiam sanguinis ebullientis à corde,
caloris fonte accepit. Insignes etiam
meatus in parenchymate spongioso
quibus multum sanguinis ferventis in-
cluditur. Ne statim languescat, & ex-
tinguatur, repetitis arteriarum ictibus
novo sanguine semper renovatur calor.
Atque sic igne vestali perpetuo fovetur
stomachus, ne in officio suo quo. unque
modo deficiens, in totius detrimentum
abeat.

Neque à corde solum supplementum
hoc caloris per arterias lieni commu-
nicatas obtinuit perpetuum; sed & ce-
rebrum in fibrarum illas complicatio-
nes incalесcentes suos copiosè emittit
spiritus, qui in fibris illis infinitis tur-
gentes, & ipsi calorem insignem & sa-
tis activum addunt.

Calore tali impregnatus lien ventri-
culum tumidum sua cavitate amicè
amplectitur, & in illo contentos cibos
coquit, digerit ac niacerat; quo defi-
ciente debilitatur concoctio; eoque
magis quam par est aucto, dissipatis
spiritibus diminuitur fibrarum ventri-
culi

De Affectione Hypochondriaca. 131

culi constrictio & fermenti actio, atque sic etiam læditur concoctio.

Subsidium tale à lieni expeti, pen-
natorum ventriculus indicat, in quibus
licet non inveniatur lien, calor quam
citissime concoctionem perficit. Illo-
rum ventriculus qui lienis foru non in-
calescit, substantia carnosæ seu paren-
chymatè densiori vestitur, in qua calor
intensior, quam in membranis cætero-
rum stomachis, qui tunicis solum fi-
brosis gaudeant, copiosius hospitatur.
In cujus parenchyma sanguis etiam li-
berè effusus calorem abunde ministrat.
Idemque suo foru perficit quod in cæ-
teris animalibus à liene substituitur.
Hinc Van-Helmont substantiam illam
carnosam lienis officium præstare arbi-
tratur, succum acidum perpetuò in-
spirantem, tanquam, à liene, quo ce-
lerius coctio celebretur. Calor certe
tam densis inclusus parietibus, multo
magis intenditur, citiusque suum per-
ficit opus. Ignem seu calorem in-
clusum ut nihil vaporis aut spiritu-
um expiret, concoctionis opus per-
ficere diximus, non apertum; tunc
enim humiditate absorpta exiccan-

132 *De Affectione Hypochondriacæ,*

tur particulæ non dissolvuntur.

Præter hoc lienis officium, alium, quem gratia fibrarum nervique insignioris adeptus est, usum assignare possumus. Nempe ut per nervum, mediantribus nervosis illis fibris in lienis parenchymate complicatis, sanguis à spiritibus animalibus ad nutum passionum commoveatur & agitetur. In sanguinem agere spiritus animales, rubor ille in facie verecundè erubescantis: priapismus statim ad rerum venerearum vel aspectum vel auditum, extremarum frigiditas & sanguinis retractio in timore, abundè testantur.

Quo verò modo spiritus animales, qui vel in cerebro, vel in densis nervorum canalibus constringuntur, in sanguinem, qui distinctis etiam continetur vasibus; aut quo in loco præcipuè suum exerceant dominium, primamque figunt impressionem, nondum constat. In corde, nervorum distributiones musculosis seu carnosis illius particulis dispensantur; sanguinem in ventriculis immediare non attingunt. In hepate nervorum surculi parvi sunt, & vasorum membranis tantum distribuuntur. Lieni

vero

De Affectione Hypochondriaca. 133

vero insignior nervi furculus, quam aliis visceribus conceditur; cui amplum fibrarum nervosarum rete, per totum parenchymatis tractum dispersum, adnectitur, quod parenchyma minutilum rarè investit. Imo nudæ aliquando sanguini perlabenti exponuntur fibræ; non ut liquorem aliquem ex amne illo ebiberent sanguineo; sed ut hic forsan spirituum animalium iussa sentiat sanguis, ut ipse etiam animæ imperio obediens, singulos ejus observe motus.

CAP.

CAP. V.

De succo Acido seu Melancholico.

DE succo Melancholico dicturus, primo de veterum opinione; deinde de esse; an scilicet talis in homine sano reperiatur? hic inquirendum est. Quali caractere illum descripserunt authores, primo prospiciendum est. Melancholia (inquiunt) est pars chyli terrestrior & faculenta, à liene separata per ramum splenicum, atque inde in ventriculum, ad ciendum appetitum & concoctionem accelerandum eructatur. Hanc, facem sanguinis appellant, & partem quartam in generatione illius constituere dicunt; ex quâ etiam quartus oritur complexionum seu temperamentorum ordo, scilicet melancholica.

Hospitium & receptaculum hujus in liene præcedenti capite diruimus, nec non & eructionem in ventriculum, & separa-

De Affectione Hypochondriaca. 139

separationem per ramum splenicum, aut vas breve, esse impossibilem antea demonstravimus. An vero ad constitutionem sanguinis sit necessaria, in illoque ut pars illius constitutiva conservetur, cum humorem excrementitium & ab illo separandum ipsi fateantur, dubitandum est; et quemquam alium in corpore obtinere usum aut locum non magis credendum esse arbitramur. Sanguis ex iis non generatur, quæ natura ab illo separanda studiose curavit: ex illis solum conflatur particulis, quibus in partium nutritione opus est; sed nulla pars bile aut melancholiâ nutritur; ergo nec ad sanguinis constitutionem necessariae sint æstimandæ. Non ignoramus assignatam melancholiæ divisionem in excrementitiam, & naturalem, quam sanguinis partem esse crassiorem, ex cuius abundantia & prævalentia temperamentum oriri melancholicum asserunt; cui verò, licet nomen imponatur, definitio non convenit: dari sanguinis partem crassiorem concedimus, sed vel hanc non esse melancholiâ, aut male definiti illam statuimus. In liene, ut ex
de-

136 *De Affectione Hypochondriaca.*

definitione supra allata videri liceat, hanc generari, aut in ventriculum eructari; aut illorum omnium quæ à melancholia fieri dicunt, esse authorem, prorsus negamus. Effectus qui in humano corpore melancholiæ, cū in statu naturali conservetur, ascribuntur, sunt vellicatio in ventriculi orificio appetitum excitans, & vis concoctionem promovendi: cum autem naturæ limites excedat, Cerebri ac cordis spiritus obnubilat, tristitiam inde & effectum hunc hypochondriacum causat. Sed hi crassiori sanguinis parti duntaxat non conveniunt, sed potius acido illo & excrementitio humori assignandi sunt.

Excrementitiam autem melancholiam, ex professo non intendere naturam judicamus; cum in sano homine nec vomitu, nec successu, nec aliis excretioni dicatis secessibus, talis rejiciatur humor: nec in dissectione quidpiam illi reperitur simile, unde talem fingamus humorem. A liene non eructari aut inspirari in ventriculum ostendimus. Quod ad usum etiam & necessitatem attinet in sanis locum non habere existimamus; tantum enim abest, ut illi
manum

De Affectione Hypochondriaca. 137

manum ministret subsidialem, ut appetitui potius officere, & concoctionem impedire & depravare cernamus.

10. Appetitus illo non irritatur; famelica enim illa ventriculi contractio, non à vellicatione ab acido hoc succo melancholico, secundum Neotericorum placita: neque a sensu suctionis, & attractionis venarum inanitarum oritur: uti veteres excogitarunt medici. Non à sensu suctionis venarum, quia chylus à ventriculo secessit fibrarum ejus contractione; non suctione expromitur. Deinde non vellicatione ab acido irritatur, vellicatio partium nervosarum ab acidis humoribus, semper dolorem & molestiam affert. Neque ab assumptis tam cito sedaretur; sed præsens semper perpetuam excitaret vellicationem inspirata aciditas, quæ continuo à liene effusa non minus in ventriculi tunicas ageret quam in cibos assumptos; nulla intercederet quies, nec à ventriculo aut ab assumptis ob perpetuam inspirationem contemperaretur. Præterea, ut in praxi observatur, cum copiose acida hæc congeritur materia, in ventriculo, diu retardatur vellicationis illius sensus & cum

138 *De Affectione Hypochondriaca.*

cum rursus acidis concomitatur etiam
 continua inappetentia, & a cibis gra-
 vedo molesta. Itinera in tempestatibus
 nivalibus, aut mora in nive longior, ap-
 petitum egregie excitant; non autem
 acidum hunc augendo humorem, vel in
 liene aut ventriculo; tam brevi enim
 spatio fieri nequit nova humoris gene-
 ratio; sed quia frigoris extremam activi-
 tate ventriculi, sicut & omnium nervo-
 sarum partium fibrarum maxime contrin-
 guntur; & inde calor magis inclusus,
 quam citissime ingestorum solvit com-
 pagem, ac celerius fibrarum, fortiori com-
 pressionem suam deponunt onus. Excita-
 tur itaque fames cum ventriculi fibrarum
 continuata, post cremoris expulsionem
 in intestina, actione se stringentes ni-
 miumque contrahentes, a vehementi
 constrictione dolorem illum, quem fa-
 mem & appetitum denominant, in ven-
 triculo concitant. Atque sic appetitum
 non acido hoc effici succo, aut ventrum
 fustione, sed fibrarum nimia constric-
 tione fieri judicamus. Hoc autem subita-
 neam famis sedatione, quam primum ven-
 triculi cavitatem pene attrigerunt cibi
 vel potus, fit manifestum; tunc enim
 ventriculo

De Affectione Hypochondriaca. 139

ventriculo rursus distento ab ingetis, relaxantur fibræ nimis modo contractæ, & laboriosa strictaque compressio, in placidam gratamque mutatur relaxationem, sedatur dolor, tolliturque fames.

20. Concoctionem non adjuvat, quia in sanis nullum illius reperitur vestigium, in quibus tamen viriliter satis facultas hæc suum peragit officium, & sine illo fieri non dubitamus, cujus præsentiam ne ructus quidam acidus unquam confitetur. Deinde ut argumentum illorum qui contra calorem humidum, digestionis opificem militant, retorqueamus:

Quo quæque causa potentior est in natura, eo effectum suum potentius efficit. Si ab acido hoc succo perficiatur concoctio, quo magis in ventriculo abundat, eo celebrior fieri debuit concoctio, & majorem aciditatem continuo feliciores digestio sequeretur, sed hoc falsum esse, vomitiones acidæ, quæ cum vitrioli spiritu aciditate sæpe contendunt, cum inconcoctis hysterinis æpissime cibis testantur. Præterea quæ ventriculum perpetuis cruciatibus laessunt, ac fermentationem, æstum ac flatum

140 *De Affectione Hypochondriaca.*

flatus generant, coctionem non adjuvant, sed aciditas illa fermentationem & ebullitionem parit molestant, atque ideo ventriculo nullo modo amica haberi poterit.

Talem vero in ventriculo sæpe reperiri humorem, præcipue in hypochondriacis; satis ex ægrorum querelis constat. Hæc scribenti mihi sæmina hypochondriaca de acidi hujus ferocitate multum conquesta, linguam, fauces, guttur ac labia, hujus per vomitum rejectione solum, excoriari ostendebat. Quomodo vero generetur hic succus acidus, aut quid sit, hic inquirendum est. De aciditatis seu acetii generatione non conveniunt authores. Alii à spirituum fugâ, alii à fixatione fieri contendunt. Sed ut perfectam generationis hujus addiscamus notitiâ, Chymicorum implorandum est auxilium; quorum præparationibus, ut naturæ finem in ciborum digestionem & concoctionem in ventriculo, eundem quæsi verunt; sic & agendi methodum & media observarunt. In Chymicorum præparationibus digestionem semper præmitti necessarium esse compertum est; qua particularum compage

soluta

De Affectione Hypochondriaca. 141

olutâ quælibet pars sincera & immista
b invicem separari poterit. Solutæ par-
ticulæ ac libetæ, altera in alterutram
gens, motum quendam confusum &
uasi ebullitionem, quem fermentatio-
nem nominarunt, excitant: qualem in
austo aut cervisia nova, cum à fermenti
dditione totum ejus corpus commove-
i, agitari, & effervesce videmus: quâ
major & facilior fit particularum solu-
tio, crassa à tenuibus separantur, ac la-
itantes omnes provocantur spiritus.
articulis sic facta fermentatione libe-
atis, digestionem fieri perfectam dici-
mus in chymicis; ac ventriculus hac
eracta operatione concoctionem suam
celebravit, & inde levi compressione
contentam in intestina depellit materi-
am, ut tinctura chylosa per vasa separe-
ar lactea: et tunc etiam in operationi-
bus chymicis suam inchoat distillatio-
nem, seu tincturæ separationem chymi-
cis. Si vero hoc fermentationis momen-
um anticipans, distillare inceperit;
paucissimos accipiet spiritus, vel tinctu-
ram dilutam paucissimis impregnatam
articulis obrinebit. Si vero diutius
in fermentatione relinquatur materia,
acescit

142 *De Affectione Hypochondriaca.*

acescit statim, putrescit, mucorem contrahit, & paucissimos etiam reddit spiritus. In fermentationis anticipatione inopia fit spirituum, quia nondum perfecta fermentatione, in cæteris incarcerati particulis includuntur, nec ab illis separari poterint. In fermentationis tempore diutius neglecto, vel à sale acido figuntur, atque sic inseparabiles relinquuntur; vel solutis vinculis effugiunt & perduntur. Atque sic aciditatem in principio putrefactionis manifestari ejusque indicium esse constat: resque sola fermentatione ad separationem satis esse liberatas, priusquam acescere incipiant, etiam manifestum est. Agitationem illam autem & effervescentiâ in fermentatione à mutua salium dissolutorum inter se pugna fieri existimamus. Cum sales acidi in cæteris particulis effervescentiam & turbationem accendant, ut donec unus vel alter figatur, & mortificetur, nulla particulis reliquis concedatur quies. Si à sale acido cæteri figuntur sales, & mortificentur (quod mora longiori & temporis diuturnitate fit) in succum acidum degenerant: Si à cæteris figatur acidus, dulcescit statim, suam-

que

de Affectione Hypochondriaca. 143

ue amittit aciditatem. Cum ex corallis
um succo Limonum seu oxycanthi aci-
o conficiatur syrupus, in primo con-
ressu Itreptus ac ebullitio cum insigni
alore concitantur, quibus sedatis dul-
escit succus, omnisque aufertur acidi-
s.

Deinde effervescentiam hanc & agi-
tationem in fermentatione à salium di-
erforum (quorum unus est acidus) dis-
olutione fieri patet; quia in succis à
quibus sal iste separatur talis non inve-
itur fermentatio, aut in quibus parva
ejus reperitur quantitas, minor est tur-
atio aut tarda. In calce viva, aut succis
in quibus abunde luxuriat sal iste aci-
us, quamprimum congregiantur sales,
reptus & incendium statim illorum
indicant pugnam.

Quod vero ex salium pugna fiat,
manifestū, est quia in tempestatibus hu-
midis, & calidis illam melius succede-
e; imo cervisiam, & musta tali aëris
constitutione, fermentationem renova-
e, & turbari rursus videmus. Cum sci-
cet ab aëre humido sales dissolvuntur,
in priori opere soluti non fuere; ac
novam inchoant fermentationem.

Quod

144 *De Affectione Hypochondriaca.*

Quod vero putredinis indicium haberi meretur aciditas, lactis indicat coagulatio, cum diutius in vase aliquo reservetur; cum sales sponte soluti, ab externo solum aere commoti, totius dissolutionem inchoaverint: acescit statim, & putrefactionis indicia evidentissime inde cernuntur. Sic et liquores omnes, vegetabilium succi, carniū jura, ipsaque carniū substantia, nisi fumo & calore exiccata fuerit, unde salium dissolutio retardetur, quamprimum putrescere inceperint, aciditatis odorem & saporem induunt. Imo vasa ipsa in quibus lac aut ejusmodi succi putrescentes conservantur, tali inficiuntur sapore, & aciditate suā adhærente lac coagulant, cæterosque liquores acore, ut citius putrescant, inquinant. Præterea ut à putredine conserventur carnes, aut fructus à mulierculis sale aut saccharo condiuntur, quibus sal acidus figatur, & mortificetur; atque sic mutua pro tempore interdicitur pugna & particularum unio reservatur integra.

Hiscè positis, Melancholiæ, seu aciditatis illius succi generationem, in ventriculo illustrare facile erit. Venterculus sua
formâ

De Affectione Hypochondriaca. 143

omnē sacculum repræsentat membræ-
eum, omni fibrarum genere, scilicet
rectis, obliquis & transversis, quibus se
indique stringat, contextum; utraque
ejus orificia, & quo cibos assumpsit, &
quo rursus digestos in intestina exone-
at; in suprema ejus parte posita sunt;
inde cibi quamprimum recipiantur
non statim suo pondere in intestina fe-
ciuntur; sed illos primo levi fibrarum
contractione quasi sacculo inclusos com-
primit ventriculus, & amplectitur; &
calore humido illius partiumque ad-
centium, comminuantur, dissolvantur,
& in lævigatam materiam, disjun-
tis fermentatione particulis redigan-
tur; per pylorum teneriores partes in
intestina continuatâ fibrarum contracti-
one propellit. Si vero accidentali ali-
qua, vel naturali fibrarum debilitate
contingat, ut totum non exprimatur: il-
lud quod in fundo remanserit, vel pa-
ietibus adhæserit, longiori mora, &
diori fermentatione putrescens, a-
scit statim, & ingesta postea omnia,
indò ipsas ventriculi tunicas tali infi-
t sapore. Imò si multum hujus relictæ
materiæ in ventriculo fuerit collectum,

H majorem

146 *De Affectione Hypochondriaca.*

maiores semper acquirit aco-em, imò
 sapissime spiritibus pane dixeram cor-
 rohisvis pregnans, ingesta omnia ferment-
 tat, exagitat, eodem imbuit sapore &
 ventriculi tunicas importune laceffit.
 Donec tandem nausea irritatus, totum,
 quod longiori spatio, leviori compres-
 sione per pylorum pederentim expres-
 surus erat ventriculus, unica quasi con-
 vulsivâ contractione, sursum rursus per
 alterum orificium evomit, quod dentes
 suâ acerbitate maximè ferit, & gulam
 ardore conflagranti multum affligit.
 Hinc aciditatem ventriculi tantæ apud
 auctores astimationis putredinis solum
 esse progeniem, & appetitum frustrare,
 concoctionem debilitare, ac multorum
 inde in hypochondriacis symptoma-
 tum, crudelem esse authorem constat;
 nullibi naturale ejus reperitur in sanis
 hospitium, aut parens.

In ventriculo virtutem seu faculta-
 tem fermentandi, quæ calori in con-
 coctione ministrat, supra concessimus,
 quâ menstruum, potulenta scilicet seu
 liquida ciborum pars impregnata, inge-
 storum sales partesque solidiores citius
 penetret, sequacemque ducat calorem,

totius solvat compagem. An vero talis naturaliter sit ventriculo innata facultas, aut à succo in illo, etiam dum in utero contineatur fœtus, incluso; aut ostendat a ciborum putrefactione tale obviat inquinamentum, quod à reliqua chyli portione fovetur semper & augeatur; alteriorem requirit examinationem. Vituli seu agni sugentis stomachus, aquâ licet sæpius repetita lavetur cultum, diuque maceretur, facultatem non perdidit tamen, sed lac statim coctum & congluat. Senioris vero stomachus, qui non lacte, sed alimento nutritur alio, frumento scilicet aut gramine, non nisi spatio longiori, & maiore provocatus calore lac condensat. Miasmate scilicet à lacte impresso jam temporis diuturnitate evanescente, debilitatur illa cogendi facultas. Adeo ut si non totum cultatis à Miasmate, ab ingestis jam incodis impresso, obtinuerit ventriculus; illius augmentum inde petere verisimile iudicatur. In Cœmeteriis putricis, in quibus multæ ac frequentes sunt sepulturae, præcipue, si maiore humido irrigentur, corpora citius putrescunt inhumata, quam in aliis locis. In

148 *De Affectione Hypochondriaca.*

cœmeterio S. Innocentii Parisiis, in horis viginti quatuor sepulta putrescere aiunt, vivaque adhuc, animaque aliquid retinentia membra, quasi dilaniat penitusque dissolvit edax illud terræ fermentum. Putrida etiam poma proximis citissime adducunt putredinem. Ciborum etiam portionem jam concoctam, aliorum concoctionem multum accelerare opinatur Verulamius. Quia huiusmodi inquinamenti impregnata humiditas, ob familiaritatem citius & magis amice in penitiores ingestorum recessus admittitur, unde facilius fit partium solutio, & digestio seu corruptio acceleratur.

A concoctis seu putrescentibus cibis, non solum miasma hoc, seu fermentandi virtus ventriculi tunicis imprimitur, sed diversorum etiam ciborum aversionem & odium insigi verisimile est, cum prius in stomacho putrescentes nauseam inferrebant, tale in posterum tunicis durabile insigunt inquinamentum; ut perpetuum illorum concilietur odium, ac hostili semper nausea tales respiciant cibos, donec longiori temporis intervallo, miasma illud peregrinum exterminetur.

C A P.

C A P. VI.

Historiæ cum causis examinatio.

UT causas assignatas sufficien-
tes, & vere hujus affectio-
nis esse causas illustremus, il-
larum cum diagnosticis in morbi histo-
ria positis convenientiam examine-
mus.

I. Ventriculum Hypochondriaco-
rum laborare semper nec cibos ferre,
sed in materiam viscidam & acidam
commutare constat.

Neque mirum sane, cum in ipso la-
teat mali fomes & origo. Relaxatæ enim
ventriculi fibræ admissos cibos non am-
plectuntur, neque comminutos in inte-
stina propellunt; sed in fundo ventri-
culi, quasi in sacculo, diutius commo-
vantes putrescunt, & in humorem aci-
dum ac viscidum degenerant, unde per-
petua fermentatione non solum ingesta
eadem inficiantur tinctura, sed & ipsæ
ventriculi tunica, contagio acido im-
pregnata, cibos & potus quoscunque
H 3 eodem

150 *De Affectione Hypochondriaca.*

eodem semper tingunt inquinamento. Hinc non solum chylus generatur vitiosus, sed & ventriculum ac hypochondria cum dolore insigni tendentes semper excitantur flatus, qui à succo illo acido erumpentes acrimoniæ participes, nervosum ventriculi orificium vellicantes, dolorem exasperant, cardialgiam & syncopen quandoque efficiunt. Perpetua vero ciborum agitatio oritur, fermentatio & quasi ebullitio; unde tenuiores illorum sublimatæ particulæ, os ac linguam saliva & humiditate aquea replent; atq; inde frequens sputatio principii hujus affectus comes reperitur inseparabilis. Cum vero Intemperies in ventriculo adoleverit, vigetque aciditas, tunicæ exiccantur nervosæ, & molesta inde excitatur, potulentis non extinguenda, sitis. Furiosa hæc in ventriculo humorum commotio demulceri nequeat, priusquam viscidus ille ac acidus ciborum cremor vomitu rejiciatur; unde furor paulo lenitur symptomatum, qui à ciborum ingestione statim recrudescit. Neque aliquando melior successus fortunat jejunos; quorum ventriculis viscida illa ac limosa adhærens mate-

De Affectione Hypochondriaca. 151

materia, vellicationis ac tensionis author perpetuus evadit, neque quietem, vel minimam sperat doloris intermissionem hypochondriacus, priusquam potulentis ferina illa lenitur acerbitas. Ventriculum ita & vacuum, & cibis refertum semper laborare visum est: a dolore scilicet extersivo, à flatibus nimium tunicas ejus tendentibus; cum maxima ciborum pars fracescit, & fermentationis vi facessit in flatus; vel cum aciditatis acrimonia tunica adeo vellicantur nervosa, ut nausea & continuo vomendi urgentur desiderio, nisi potulenta aliqua ingesta materia diluatur & contemperetur succus iste acidus.

Hæc ciborum subita in flatibus resolutio, dolores in dorso sæpe procreavit, & calculi terriculamenta simulavit, imo ab incautis pro nephritico sæpe curatur medicis, dum distenta flatibus intestina, ligamenta, quibus dorso affixa propendeant, magis quam par est extendant, & doloribus tensivis in dorso excruciant ægros.

Temperamenta cholericæ & habitus corporis tenuior furori hujus mali potissime

sine subjiuntur quia à caloris augmento dissipantur magis spiritus, & fibræ laxiores & magis flaccidæ redduntur; adeo ut assumpti cibi in ventriculo rite comprimi, & dissoluti feliciter expelli nequeant, sed in acidam, viscosam & acerbam degenerant materiam; Quâ calor viscerum, hepatis scilicet ac lienis, magis quam par erat exagitans, in flatus abunde resolvit, atque hinc affectioni huic magis obnoxii inveniuntur cholericî quorum viscera intemperie laborant calidiori: viri etiam & ætas media, quorum calor naturalem & proportionatam humidi commissionem superaverit, hoc magis infestantur malo, quam faminæ aut adolescentes; Hinc habitus corporis extenuatur semper, neque pinguescunt, dum malo laborant hypochondriaco.

Alvus semper adstricta est; pigre sua deponit excrementa. Cum ventriculus tarde suum exequitur officium, venter difficulter suum solvit tributum. Male concoctus ciborum cremor fit viscidus, & in intestinis tenuiori per læteas privatus succo, multo tenacius illorum parietibus adhæret, & difficilem reddit excre-

De Affectione Hypochondriaca. 153

excretionem. A limosis etiam primæ concoctionis succis obstructa in hepate vasa cholidoha, expultricis denegant stimulum, adeo ut bilis acrimonia ad evacuationem non sollicitantur intestina, sed calore exiccata, in scybala formantur excrementa, & raro excernuntur. Flatus interim retenti abdomen & hypochondria tendunt; atque hinc rugitus & murmura in coli cellulis inflatis, ad latus sinistrum præcipue, audiuntur. Quæ non sola excruciant ægros, sed fluctuatio à liquidis ventriculi fundo contentis, anxietate & querelis sollicitat.

Quædoque à ventriculi & intestinorum lubricitate, acidus ciborum cremor viscidus ac sæculentus lactearum ora præterlabens gracilia, liquidiores alvi fæces, sed ob visciditatem limosas, terrestres, bubulo fæcori similes reddit, plerumque nigras. Hæc alvi lubricitas non accidit solum, quia ora lactearum vix morbilia reperiantur, dum à copia viscidæ hujus materiæ, tota intestinorum oblinitur cavitas, ut in membraneam nonnunquam incrassetur durtiem, quæ lactearum ora protinus oc-

154 *De Affectione Hypochondriacâ.*

cludat ; Sed quia aciores à succis red-
dantur acidis , nimum expulſivam ſol-
licitant facultatem , ut nondum chylo
privatâ liquidiores egerantur fæces, ac
plerumque nigræ. Vitriolata enim illa-
rum aciditas cum bilioſo ſale conjuncta,
nigredinem ſtatim concipit, ut in omni
ſaliû cum vitriolo commiſſione videre
liceat. Si diu obſtructa fuere vaſa choli-
docha, jamque reſerata copioſe veſiculæ
biliaris depoſuere recrementum; humo-
res acres & exaſperati, alvi fluxum ſape
excitant valde moleſtum ; tunc bilioſû,
cum excrementa flavo vel viridi tingun-
tur colore , à copia bilis effuſa; ſi vero
copia acidia ventriculo effluentis ſucci
bilioſas figat ſales , nigras reddit fæces,
quas melancholicas nominarunt deje-
ctiones, quia nigro inficiantur colore.

Æſtus in hypochondriis, moleſto ar-
dore nunc in dextro, plerumque autem
in ſiniſtro, nunc utroque latere miſcellos
excruciat, qui ab ingeſtis non extingui-
tur, ſed fermentatione perpetua magis
excandescit. Acidus enim ille ac fervi-
dus à putrefactione in ventriculo hu-
mor, quo majorem concitat fermenta-
tione. n ac motum, eo & majus parit in-
cendium:

De Affectione Hypochondriaca. 155

cendum: à motu enim nascitur calor. Porro in aciditate calor latet fortis, uti vis illius caustica abunde testatur, non minore ardore aut vehementia pungit acidus succus, quam liquor fervidus; vitrioli oleum caloris æque ac aciditatis effectus commonstrat: acidisque vomitionibus non minus calore excandescit guttur, quam aciditate exasperatur. Imo sæpe tanta est hujus succi acrimonia, ut diuturniori per vomitum ejectione in morbo hoc excoriatum noverim œsophagum: & laryngem contactu solum adeo exasperatum & exiccatum, ut vocem raucam & insonoram redderet, imo gramen & plantas acido hoc per vomitum rejecto conspersas succo, exarescere vidimus, adeo ut vitrioli oleo aciditate & vi caustica contendere videatur. Mirum itaque non habeatur si æstus generet in ventriculo; qui cum à flatibus in utrumque extendatur latus, in hypochondriis etiam utrisque æstuantis hujus humoris furorem hospitare sentiat æger.

Neque in ventriculo solū furentis hujus succi malitia reperitur, sed cū chylo distributus efficit ut ejus fermentatione tota ferveat sanguinis massa, in qua salium diversorum pugna, in toto venoso genere

156 *De Affectione Hypochondriacæ,*
genere tumultuosam concitavit ebulli-
tionem, quæ nunc in hepatis, nunc lienis
vasibus inchoata, æstus & ardorem
nunc in dextro, nunc in sinistro latere
procuravit.

Urina nunc tenuis (paroxyfmi instan-
tis semper indicium) tunc, vel cum ad-
modum parvo sedimento, & inæqu coasta
est; plerumque turbida, crassa, rubra,
acris ac fatida, cum sedimento rubro,
sabuloso, arenularum instar, matularum
parietibus adhærente cernitur.

Urina ex potulenta & aquosa ciborum
parte constituitur, quæ prout maiore
vel minore salis ciborum copia impreg-
netur, & quo longiori vel breviori spa-
tio à calore viscerum vel debiliori, vel
forti coquatur, coloris etiam diversita-
tem obtinuit. Lixivio solum quovis sa-
le impregnato, coctione duntaxat diu-
turniori, vel breviori, omnes urinarum
colores simulavimus. Aqua multa cum
sale paucò admixta & parum cocta, lixi-
vium pallidum, tenue & aquosum red-
didit. Si vero diutius cum maiore salis
copia coquatur, saturatum magis statim
induit colorem, vel flavum, subrusum,
rubrum & fuscum.

In-

De Affectione Hypochondriaca. 157

Inconcoctis ita ciborum particulis à debili & relaxato stomacho, pars potulenta citissime dilabitur, tenui solummodo infesta tinctura; sales in ventriculo non separati dum chylus efficiatur, in corde & venis cum fit sanguis, serum non tingunt: primæ coctionis error non corrigit natura in secunda; adeo ut si nulla fuerit particularum in ventriculo solutio, cibus adhuc non digestis, & indissolutis, in venoso genere nulla sequetur separatio & tinctura. Atque sic potulenta ciborum pars intincta pæne, paucisque salium impregnata particulis ad renes corrui, & urinam tenuem ac pallidam efficit sine sedimento.

Urinæ sedimentum est excrementum concoctionis in corde & toto venoso genere, qua deficiente mirum non est, si & illo destituatur urina. Hæc urinæ tenuitas instantis paroxysmi est indicium. Quia urinæ tenuitas concoctionis debilitatem arguit; unde cibus in ventriculo non concoctis, flatu copiose excitantur, qui symptomatum plurium auctores sunt; Et non cocta in acorem degenerant ingesta, quorum fermentatione

furenti

158 *De Affectione Hypochondriaca.*

furenti repente omnia exasperantur symptomata, & fit paroxysmus:

Plerumque vero crassa, turbida, ac rubra cum sedimento rubro & sabuloso hypochondriacorum fit urina. Cum scilicet obstrueta in hepate vasa cholidocha, excrementum non deponunt per intestina biliosum; sed cum sero per renes excernitur; tunc crassa fit urina, turbida, fetida & acris cum sedimento rubro ac crasso, nitente, arenularum instar, parietibus matularum adhærente: crassiores bilis particulae instar lapidis saepe in ipso hepatis concresecunt parenchymate, multoque sale abundant, quæ non solum urinas saturo tingunt colore, sed & sedimentum crassum, sabulosum ac splendens saepe reddit. Si vero acidus ille succus copiose à ventriculo venis communicetur, in toto venoso genere sanguinis ac humorum magna fit commotio, & si à sale acido figantur reliqui sales, fit urina nigra, quæ copiosè reddita, materiam peccantem secum duxit & paroxysmum solvit.

Anxietas, cordis palpitatio, pulsus inordinatus intermittens, & saepe lipothymy-

De Affectione Hypochondriaca. 159

thymia, inter signa enumerantur pathognomica. Symptomata hæc cum hysteriis communia habent hypochondriaci; & à sanguine tenui ac flatulento originem petunt; sanguis hypochondriacorum tenuis à chylo aquoso indigesto, particulis fibrosis in ventriculo non separatis, generatur; diluta & tenuis ciborum tinctura tenuem & pallidum constituit sanguinem. Hic subito nonnunquam à succo exagitatus acido, ac fermentatione commotus, fervidus ac flatulentus cum impetu majori sæpius quam debuit in cordis thalamos irrumpit; unde motus concitator, frequentior ac rapidus subito conciliatur, quo sinus suds ab æstuantis liberetur inimico; quo detumefcente, ordinatè rursus cor suas perficit contractiones: atque hunc motum inordinatum palpitacionem vocant: cum scilicet ab æstuantis sanguine subito & confertim in cordis ventriculos conflante, facultas expulsiua validis ac crebris contractionibus ad expellendum onus illud peregrinum & molestum instigetur. Atque hoc fit æqualibus nonnunquam motibus sed violentioribus quam par erat.

Ali-

160 *De Affectione Hypochondriaca.*

Aliquando inæqualibus, cum impeditos aliquos pulsus necessitate magis urgente, unico sequente majore reficiat. Aliquando cordis ventriculi adeo sanguine hoc tenui ac flatulento, confertim irruente infarciuntur, ut distenti aliquantisper à flatibus, subito rarefactis, sine motu retineantur, pulsusque plane intermittit. Deestque una, vel duæ, vel tres pulsationes; verum postea cor rursus discussis flatibus motum aggreditur. Si verò diutius continuatur hæc ventriculorum inflatio, in motu plane deficit cor; sequiturque, reliquis partibus, denegato sanguine vitali, lipothymia: Anxietas & gravitas circa cor semper contristant ægros, dum scilicet sanguinis tenuioris fermentatione à succis fracidis, subitaque rarefactione, cordis sinus, flaccidique pulmonum lobi majori quam par erat copia infarciantur: adeo ut motu libero, ac facili, cor suos thalamos ventilare nequeat.

Eodem modo distenta pulmonum vasa respirationem reddunt difficilem; præcipuè si motu violentiori subito rarefit sanguis, jam a tenuitate

De Affectione Hypochondriaca. 161

tate & perpetua fermentatione satis mobilis: hinc pectoris sentiunt constrictionem graviterque respirant.

Hæc flatulenti & tenuioris sanguinis exagitatio rapidusque motus ac fervor capitis concitarunt dolores: mania sæpe, vertigines, epilepsia & apoplexia nonnunquã authores. Cum enim tenuis nimiumque rarefactus sanguis cerebri vasa maxime distendat, dolores tensivos parit; nimiaque vasorum repletionem liber spirituum motus interceptitur; adeo ut nunc singulae, nunc aliquæ solum deficient partes. A particularium nervorum scilicet compressionem partibus aliquibus spirituum denegatur influxus; Hinc sæpe deficit loquela, linguaque rigit, circa oculos caligo obversatur. Aliquando totum nervosum genus spiritibus privatur, sequiturque Apoplexia. Hinc animi etiam depravantur facultates, Memoria aboletur, phantasia turbatur, motus, tristitia, falsaque imaginatio excruciat. A malo sanguine impuri generantur spiritus, & si in instrumentis deficiat, actiones nunquam perfectas instituit natura.

Si

162 *De Affectione Hypochondriaca.*

Si vero flatus in cerebri substantiam erumpentes cum spiritibus uniantur animalibus, vertiginem causant. Atque hoc fit cum flatus subito à sanguinis fermentatione rarefacti, a duriori cranio, densisque membranis reverberentur, atque hinc sequentium copia pressi, exitum qui in summo negatur, a latere quærentes, ac undique conclusi circulari circumferuntur motu. Hinc ob spirituales similitudinem cum spiritibus (qui suâ natura mobiles semper sunt & inquieti) facile commisti, eodem modo illas etiam circumducunt: unde objectorum species spiritibus communicatæ, quasi circulariter etiam mobiles representantur, omniaque ab extra circumferri videntur.

Hæc sanguinis tenuioris fermentatio vigilias etiam somnumque perturbatum, præcipuè post mediam noctem efficit. Ad meridiem nocturnum bene dormientes, postea insomniis terrore plenis, & vigiliis molestantur; præsertim si coena largiori, vel sero ingesta ventriculus gravetur, ac tarde suum perfecit officium. Tunc chylus aciditate majore infectus cum in media nocte

De Affectione Hypochondriaca. 163

nocte distributionis scilicet tempore, reliquo admisceatur sanguine, nova in venis inchoatur fermentatio & agitatio. Spiritus animales fervore sanguinis concitantur, benignique vapores, qui spiritus quodammodo figentes a motu ad quietem invitant; turbulenta illa fermentatione dissipantur, spiritusque rursus diffluunt, & ægri somno excitantur. In quibusdam vero cum perfecta hac fermentatione spirituum sistatur furor, placidè rursus post tertiam vel quartam horam manè succedit somnus.

Pulsatio in Hypochondrio sinistro, præcipuè si motu vehementiori aut ira commoveatur æger, magna sentitur. Atque hoc fit a motu arteriæ magnæ ac furculorum cæliacæ sub colo & ventriculo flatibus maximè distentis, recumbentium, cum ventriculi, ac coli inflati latus inferius pulsaverint; in superius etiam flatuum constrictorum motu continuatur pulsus, & extrema admotæque manum ferit. Arteriæ primo tunicas inferiores seu posticas, illis sc. proximas flatibus tensas pulsant; hinc inclusus agitur flatus, qui
latus

164 *De Affectione Hypochondriaca.*

latus oppositum movet, quo commoto, moventur etiam extrema; illisque superpositam manum, veluti in tympano bellico, percussio capite moventur statim chordæ in latere opposito.

Post passum facies rubore conspersa multum accenditur; quod non tantum à nova sanguinis fermentatione & agitatione accidit, quæ causarum prioritatem obtinuit, unde majorem obtrahit fervorem, ac tenuitatem, magisque vasa distendit: sed quia ventriculus jam flatibus tensus, majori nunc ingestorum copia infarctus, Aortam adeo comprimit, ut à corde deorsum sanguinis impediatur motus circularis, & à cordis propulsus ventriculis, sursum potius in capitis & pulmonum vasibus propellitur; unde difficilior etiam post passum redditur respiratio, gravatur caput, venæque capillares in facie, tenui frequentique infarctæ sanguine & incendium & ruborem faciunt; A difficili etiam respiratione augetur rubor, cum vel pulmonibus otiosis aut nimium infarctis; à Jugularibus venis recurrens non admittatur sanguis; ut in suffocatis &

Asthma-

De Affectione Hypochondriaca. 165

Asthmaticis videre liceat ; quorum
pulmones agrè moventes, à faciei &
capitis venis majoribus & capillaribus
nimium infarctis, sanguinem rela-
bentem non admittunt, sed faciem
rubicundam aut lividam semper relin-
quunt.

C A P.

CAP. VII.

De iuvantibus in Hypochondriacis affectibus.

Remedia quibus malum hoc profligare conantur medici, non minus causas stabiliunt, assignatas.

Affectum hunc & ægro & medico difficilem alvi laxitate moderatâ, aut vomitu cum *evpoeia* demulceri aiunt. Quia hisce evacuationibus, acida illa, limosa ac flatulenta materia à ventriculo & intestinis deturbatur, & nisi frequentia nimis peccant, magnum inde sæpe expectatur levamen; frequens vero horum remediorum usus, ventriculum debiliorem, atque laxum magis efficit; fortiora etiam medicamenta, viscera debilitant, & calefaciunt, humoresque nimium commoventia paroxysmum asperiores generant, atque sic in mali causam degenerat remedium.

De Affectione Hypochondriaca. 167

A narium hæmorrhagia, hæmorrhoidum apertione, mensium profluvio, & varicibus etiam expectatur salus. Sanguinis ebullientis & agitati diminutionem non parum prodesse observarunt & medici & ægri: Hoc enim modo cerebrum à furenti non provocatur & accenditur sanguine, sed spiritus suos feliciter satis componit & distribuit; ut ventriculi fibræ fortius constringentes, cibos & melius amplectantur & expellant, ac vapores à pastu benigni, aciditate vel acrimoniâ infecti nullâ, spiritus illos jam facile ad quietem & somnum disponunt. Pulmonum vasa ebullienti non infarcta sanguine, non gravant respirationem; sed facile musculorum motum flaccidi sequuntur pulmones. Ventriculus, minori partium adjacentium infestus calore, rectius suum exequitur officium; spiritus animales nimio non dissipati sanguinis calore, fibræ instant, & contrahunt, ut ingesta sælicius concoquat stomachus, digesta citò in intestina comprimat, ut mora longiori acido illo non infecta inquinamento, singulis alimentum præbent idoneum.

Hæmor-

168 *De Affectione Hypochondriaca.*

Hæmorrhoidum vero apertio vel arte vel natura instituta, majorem ideo attulit utilitatem, quam venarum reliquarum sectio; quia ventriculum, intestina, cæteraque abdominis viscera immediate magis lacunat; unde sanguinis circa ventriculum diminutus fervor, flatus tam copiosè non excitat. Hæmorrhoides immediate magis à visceribus abdominis derivant, quia venæ hæmorrhoidales ab arteriis mesentericis suum recipiunt sanguinem, è quibus effusus, à Cæliacæ & Mesentericæ superioris surculis (hepati, ventriculo & lieni famulantibus) ob originis vicinitatem immediatè magis derivatur sanguis, unde minor circa ventriculum, hepar & lienem sanguinis reperitur & quantitas & fervor, saliciterque magis succedit concoctio. In brachii verò vel pedum venis, majori à visceribus concoctionis distantia separatis, non tam immediatà est derivatio, ideoque minus profuit.

Eadem ratione in mulieribus mensium profluvio symptomatum horum demulceri furorem est compertum. Atque hinc rarò faminas invenire licet.

hypo-

De Affectione Hypochondriaca. 169

hypochondriacas. Menstruali enim evacuatione à ventriculo vicinisque visceribus derivatur sanguis, & contemperatur ejus orgasmus, adeo ut facilliter sua exequantur officia. Si verò deficiat hoc naturæ præsidium, ventriculi, hepatis, lienisque vasa statim sanguinis pleniori gravantur infarctu, ut cibos nec appetant nec digerant, sed sub flatuum ac sanguinis accensi copiâ laborantes, aut à malo hoc plerumque incurabili, aut passione hysterica cruciantur.

A varicibus etiam sæpe obtinere salutem, quomodo verò varices vel morbum, vel morbi causam, aut symptomata diminuant, inquirendum est. Varices ab humoribus melancholicis, & crassis in venis congestis, illarum tumidas tendentibus fieri contendunt medici. Quomodo verò humores crassi in venis congeri poterint, sine vasorum obstructione, impedita sanguinis circulatione, rationi consentaneum non est. At obstructa vasa affectum hunc non tollunt, imo inter causarum catalogum hujus mali enumerantur. Vacuum itaque alia est indaganda generatio

I rationis

170 De Affectione Hypochondriaca.

rationis via: & a laxatis in parte aliqua venarum fibris, a nimia per flatus tensione illos generari animadvertimus. Cum fibrarum (quocunque modo debilitentur) lasa sit actio, ut æqualibus contractione non contendant viribus, sed in parte hac laxiores, magis pressioni cuilibet facile cedant: Flatus tunc in sanguine fermentatione semper commoti, locum quærentes ampliorem, venarumque latera tendentes, laxatas fibras propellunt magis, eoque in loco tunicam in tumorem mollem, & pressioni cedentem attollunt, quem vertecem appellant. Quomodo vero hi venarum tumores affectum hunc lenire poterint inquirendum est. Flatus in sanguine commotos, multorum circa ventriculum, pulmones, cor, ac cerebrum symptomatum auctores fuisse diximus, qui cum in extremis, tumoribus hisce varicosis diversorium offendant; tantâ violentiâ interna illa non excruciant viscera, atque sic sub minori paroxysmi ferocitate laborant agri; levantque dolorem varices revullis a visceribus ad extrema flatibus.

Amara

De Affectione Hypochondriaca. 171

Amara omnia prosunt & ventriculo amica habentur : laxatas quia fibras sua siccitate contrahant, ac sale quo maximè abundant putrefactionem retardant, acidos in ventriculo figunt succos & edulcorant, limosos etiam & viscosos, hepatis aliorumque viscerum obstruentes vasa, abstergunt humores ; ac superfluum, quæ relaxantur fibræ, absument & exiccant humiditatem. Dulcia è contra, fibras relaxant, ac spiritibus suis corrosivis sanguinem accendunt & fundunt, adeo ut in omni salium suctu, majori violentia in flaccidas & debiles statim ducatur partes, spiritusque dissipando, laxiores illas & debiles magis reddat.

Diureticis etiam (docente natura) mali hujus profligatur furor. Quia sic à sanguine succi illi per urinas separantur acidi, ut fermentatio illa in venis contingeretur molesta. Diuretica omnia multo sale gaudent, qui non solum tenuem illum & aquosam sanguinis partem separat, & ad renes inviat; sed & succos figit acidos; & cum sero propellit, omnique resistit fermentationi.

172 *De Affectione Hypochondriaca.*

Nova nondumque defæcata cervisia salis manipulo, aut absinthio, (in quo multum salis reperitur) infuso, clarescit; & fermentatio, quâ turbulenta & crassa fit, statim sedatur, crassæ & turbidæ præcipitantur particule, acidi figuntur sales, & dulcescit: Atque hac ratione tartarum, absinthii & centaurii sales tanti sunt in curatione hujus mali valoris; quia succos figendo & præcipitando acidus, fermentationem tollunt, atque sic sine tumultu & turbatione cibi in ventriculo dissolvuntur, & sanguis per totum pacatius circulatur Microcosmum.

Efficacissima vero chalybs & acidulæ habentur remedia; non autem quia pondere suo aut proprietate aliqua obstructions reserant, ut humores melancholici sic per sedem excernantur nigri, uti somniantur medici; sed ob facultotem stipticam.

Acidulæ ideo profunt, quia chalybis vitriolo impregnantur: chalybs vero profuit, quia sale vitriolato abundat, qui stipticam & stringentem habens facultatem partes constringit laxas, atque eo nomine malo huic adversatur.

Laxitas

De Affectione Hypochondriaca. 173

Laxas & flaccidas ventriculi fibras morbi hujus, sicuti & aliorum plurimum fuisse causam diximus; quomodo vero à ferri stipticitate subsidium & curam obtinuerunt inquirendum est.

Chalybis vitriolum est stipticum egregium, laxatas partes contrahit ac figit, flaccidas cogit ac firmat, ac disjunctas unit, debilesque sic confortat ac roborat, ut quævis suum fælicius perficiat opus. Hoc autem agit vitriolum vel superfluum & relaxantem diluendo humiditatem, ut è poris facilius exprimatur; & inde partes cogendo, sic unit & firmat; ut peregrinos tam facile non admittant humores; vel fibras exiccando, firmiores reddit, ut spiritus influentes facilius illas impleant & contrahant. Quod vero vitriolum partes condensat & contrahit, docet satis linguæ asperitas & contractio, si modo leviori tactu in illum affricetur. Panni lanei etiam qui illo tinguntur, duriores videntur, & asperius tactum feriunt, quam qui alia inficiuntur tinctura. In ventriculo itaque acceptum hoc vitriolum laxatas fibras contractiores & conslipatas magis efficit, ut ingestos cibos asperius am-

174 *De Affectione Hypochondriaca.*

plecti; & digestos facilius exprimere poterit, ut nihil in fundo acescere relinquantur, sed probe concoctus & dissolutus cibus, continuata contractione in intestina expellitur totus; ubi nova (ad-
 juncta bile) inchoatur fermentatio & inde perfecta præcipitatur ac separatur ciborum tinctura, lacteis colligenda. In quorum ora fibrarum intestinorum continuata contractio impellitur, non suctione attrahitur. Quanto autem intestinorum fibræ fortius se stringant, tanto rectius per lacteas distribuitur chylus; si vero laxiores reddantur, flatibus statim distenduntur intestina, ut chylum ab excrementis, illorum compressione ac constrictione separare nequeant. Quæ intestinorum levitas & fibrarum laxitas, vitriolo hoc chalybis facilius etiam corriguntur. Cæteraque viscera contracta ac firmiora hujus stip-
 ticitate reddita, omnem respuunt humiditatem superfluum, neque flatuum tensioni immoderate cedunt; sed omnes partium fibræ æqualiter tensæ, & contractæ æqualibus omnem violentiam opponunt viribus.

CAP.

C A P. VIII.

De nocentibus in Hypochondriacis.

NOcent primo in diata errores cum vel non iusta quantitate, aut tempore non opportuno ingerantur, aut qualitatibus nocivis impregnentur cibi.

Cibi licet succi benignioris fuerint, multumque nutrimenti facilisque concoctionis habeantur, si quantitate nimia ventriculi distendant fibras, ut expulsion tempore debito non sufficiant, acescunt statim, atque hinc molesta incitatur fermentatio, totaque inficitur chyli massa.

Siquidem si indigestis prioribus aut saltem è ventriculo cibis non exclusis, ingerantur alii; illorum fracida putredo, atque inde fermentatio molesta posteriori resolutionem impedit, & chylum viscosum, acidum & flatulentum generat.

Si

176 *De Affectione Hypochondriaca.*

Si qualitatibus gaudeant nocivis, quæ scilicet vel partium separationem retardare, aut ventriculi actione pertinacius resistere poterint. Quæ etiam ventriculi fibras nimia imbuunt humiditate, easque relaxant; aut acrimoniâ ferina ad expulsionem præcipitem excitant. Si particulis flatulentis luxurient, qualia sunt fructus hortarii, qui non solum flatibus fibrarum contractionem impediunt, sed facile ac cito putrescentes acorem contrahunt. Et quo magis spiritibus fermentatione hac exaltatis abundant, eo citius, ac majorem, asciscunt aciditatem. Succum enim spirituosum si à cæteris post fermentationem separentur particulis mitem ac blandam exuentes naturam, vinosi fiunt; sed si diutius quam par erat cum sæculis una commisceantur, à solutis salibus præcipue acidis figuntur rursus, eoque majorem contrahunt acrimoniam & ferociam, quo magis spiritibus abundant vinosis.

Ob hanc itaque rationem inimica esse omnia observantur vina, liquores fortiores & spirituosi, qui in ventriculo aciditatem majorem acquirant, & fermentationem illam ac turbationem, Hypochondriacis

ca. *De Affectione Hypochondriaca.* 177

hypochondriacis assuetam, pertinaciorē
ac citius concitant, quam liquores alii
mitiores ac minus spirituosī.

Vigiliæ nimix, exercitia immoderata,
animi nimia intentio, lucubrationes,
præsertim à cœna, & animi pathemata
affectum hunc fovere & augere solent.
Quia caloris ac spirituum revocatione
vel digestionem in ventriculo retar-
dant, aut quia sanguinem spirituosum
nimis ac flatulentum commovent ni-
mum & colliquant, unde fermentatio
universalis conciliatur, & in furorem
adiguntur particulæ spirituales somnes-
que exinde læduntur actiones.

Otium denique ac vitæ sedentaria no-
cent quia partes emolliunt ac fibras re-
laxant, unde in extremis adeo feliciter
sanguinis, non perficitur Circulatio;
sed in vasibus præcipue majoribus cele-
bratur. Atque inde ad interiora retra-
ctus calor, ea relaxat nimium ac debi-
litar, ut rite sua exequi officia neque-
ant.

C A P.

CAP. IX.

An chalybs in Affectione Hypochondriaca Utilis sit?

IN affectionis hujus curatione multum celebrari chalybem, & alterum & recentiorum observationes abunde testantur. Quomodo vero quave virtute aut energia tale præstat officium, controvertitur. De temperamento non minus litigantes; nonnulli illum temperatum, alii frigidum, alii calidum, & siccissimum esse; atque ideo in hac affectione minus convenire, volunt. Alii pondere partes obstructas permeare, & ita ab infarctu liberari vasa contendunt. Alii abstergerendi & aperiendi vim habere statuunt, atque sic mucosas obstruentesque particulas eliminari volunt, cum humores à parte cui adhæreant quasi abradat. Alii peculiarem cum humore melancholico & adusto habere cognationem,

De Affectione Hypochondriaca. 179

tem, atque ideo illam seu attrahere
seu imbibere, & cum eo uniri autu-
nant, cum bilis atra seu melancholia
vitriolata naturæ sit particeps, & fer-
uginei quid sapiat, quæ cum crassiori
chalybe unita per alvum exturbatur:
Alii illum astringere; calorem & hu-
morum efferuescentiam reprimere; at-
que ideo in dysenteria se utile habetur
remedium. Alii illum desiccare & ul-
tera agglutinare. Alii alvum turbare,
vomitusque ciere; alii vomitum fi-
tere; ac reprimere contendunt. Adeo
ut non leve foret negotium determi-
nare, an consultius illi fecerint qui in
dysenteria & hæmorrhagia (ut sistatur
fluxus) chalybis suaserunt usum: an
qui in viscerum & mesenterii obstru-
ctione ut fundantur humores & reserata
vasa infarctus exturbent suos, usum eti-
am suadeant chalybis. Sine discrimine à
medicis præferbitur, & experientia ap-
probat usum: non solum hæmorrhagias
illosque sinit fluxus, sed & hepatitislenif-
que obstructionibus aperiendis utilis est.

Diversitatem operationis quarunt
nonnulli ex diversitate præparationis.
Alii ex quantitate & proportionem do-
eos; alii ex sulphuris & mercurii com-
missione,

mitione, aut fuga, cum igne violentiori absumantur.

Sed de hisce audiamus Senertum. Preparationem quod attinet, licet plures (inquit) illum resolvendi apud chymicos reperiantur modi, omnes ad mutationem in vitriolum aut vitriolatam naturam tendunt. Præparatio itaque non diversificat effectum, cum ab illa, quæcunque fuerit, solum refurgit vitriolum, aut quid vitriolatum: quod ratione suarum qualitatum, aut partium distinctione, diversos effectus producere nequeat. Alius itaque agendi modus quærendus est, & quomodo vitriolum hoc chalybis tam solvendo quam stringendo præstet, videamus.

Vitrioli virtus propria est constringere; de quo Galen. Lib. 9. De siml. medic. facult. *Vehementissima adstrictioni admixta est caliditas non instrenua; constat ergo, quod maxime condire & servare carnes humidæ potest, nimirum caliditate humiditatem absumens, atque adstrictione substantiam contrahens & constipans; hoc enim opere nonnihil humiditatis ipsius exprimit, constringit, etiam desiccatur atque contrahitur in se substantiam carnis.* Vehementissime adstringit

De Affectione Hypochondriaca. 181

ringit vitriolum; chalybis etiam omnes præparationes vitriolum efficiunt: cum vitriolata naturæ unus & idem modus agendi, *humiditatem caliditate absumens, & adstrictione substantiam contrahens & constipans* facultate stiptica & restrictiva, qua maxime pollet, chalybem actiones hasce utraque perficere dicimus.

Fluxus omnes, hæmorrhagiam, & dysenteriam stipticitate sua cohibere facile conceditur. Intestinorum lubricitatem & laxitatem constringit; poros constipando sudores reprimat; hæmorrhagiam sistit, aperta vasa restringendo consolidat, expectorationem prohibet, im vasa cohibendo angustiora reddat.

Quomodo verò sua stipticitate contrariam peragit actionem, & obstructions, uti volunt Medici, reserant, non tam certa fide amplectitur. Camædicis, mensstruis suppressis, & hypochondriacis chalybis usum suadent, ut hepatis lienis ac uteri obstructions eliminantur; & effectum expectationi respondentem inveniunt, lunare tributum addit non mensstruata; floret facies hecticæ, & hypochondriacus suos non metuit timores. An vero hoc agit chalybs

182 *De Affectione Hypochondriaca.*

chalybs vasa aperiendo obstructa, non immerito dubitamus cum vasa in hisce affectibus re aliqua extranea non semper occludi judicamus. Sed cum vasa accidenti aliquo levi restricta, naturæ impulsui non obedientia, excretioni aut circuitui non facilem præbeant sanguini exitum; ad interiora repulsus recurrit sanguis, & ad vasa retrahitur majora. Quæ, copia affluente majore quam par erat, ulterius semper dissent relaxantur, ut in illis spatium seu hospitium largius quam soleat, præbentur. Unde ad extrema aut vasa minora non relaxata, non tanta circulatur vi, ac celeritate; sed in majoribus præcipue celebratur, adeo ut minora vasa minus distenta, onus illud naturæ molestum & plethoram deponere non sollicitantur. Atque hinc in medicorum observationibus ut obstructa æstimentur, cum revera sanguis in majoribus & nimium relaxatis internis præcipue circulatus ac retentus; in minoribus exitum aut evacuationem non quærit; sed relaxata & debilitata majora vasa, onus illud suscipiunt totum, redundantia impetum ferunt, & consuetas evacuationi excusant vias.

Hinc

de Affectione Hypochondriaca. 183

Hinc Cachecticæ Virgines menstruis deficientibus licet sanguis maxime redundat, pallidæ tamen & deoloratæ semper inveniuntur; cum venis in extremis exilibus, pulsuque debiliori. In venis autem internis majoribus, multum redundat sanguis: maximeque distendantur vasa, præcipue in pulmonibus, ac capite; atque hinc difficilis respiratio, & dolor capitis, cum narium hemorrhagia frequenti, cachexiæ comites reperiantur.

Atque hisce vicem remedii obviavit Salybs; quorum scilicet vasa interiora obstructa, aut partis alicujus particularis præcipua nimium relaxata, totius massæ redundantiam recipiunt, atque inde debilitantur, vicinas partes gravant, & debitam circulationem retardant. Sæpe vitrioli stipticitas constringit rursus & contrahit ut æquali proportionem singula vasa derivetur sanguis atque hoc modo singulis partibus proportionatus communicatur & sanguis & calor, ac vasa excretioni dicata redundantium illam ac onus proprium modo in majoribus internis contentum suscipiunt debitoque tempore excreant, non quod obstructa referat, sed quia nimium

184. *De Affectione Hypochondriaca.*

nimum relaxata constringit chalybs.

Sed hic obijci poterit, licet præparationes Chymicæ chalybem in vitriolum resolvant; atque sic siccitate sua constringat vasa, ut in dysenterica & fluxibus sistendis multum prodesse poterit: non præparatus tamen aut crudus, ut obstructions eliminentur, exhibetur; atque hoc modo efficaciter magis operatur: unde credendum est non siccitate opus hoc reservandi, ut dictum est, peragi, sed virtute alia abstergente, quâ in præparatione privatur.

Chalybs præparatus feliciori forsan successu in obstructionum eliminatione suadeatur, quam non præparatus, ac minori nausea ventriculum gravat. Ubi in stomacho scilicet, crudus æque ac in vitriolum reductus, dissolvuntur ambo, & excremento æquali nigredine tingunt. Si itaque in ventriculo solvatur crudus, aut non præparatus; idemque quod à chymicis artificiali illorum dissolutione, naturali illa in ventriculo agatur; eosdemque & in morbo & excretis edat effectus; quid obstat quin & easdem facultates ab eodem agendi principio luxuriantes habere concludamus?

F I N I S.

riaca
bs.
para-
vitrio-
ate sua
rica &
fle po-
t cru-
, ex-
caciter
um est
di, ut
lia ab-
ivatur.
foran
tione
us, ac
t. Ubi
que ac
vuntur
redine
solva-
idem-
lorum
triculo
& ex-
quin &
agendi
ncluda-



